

第2類医薬品

漢方製剤



中国の民間説話「白蛇伝」に登場する女性を伝統的な漢方のイメージとしてシンボルマークとしたものです。

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。  
また必要な時に読めるように大切に保管してください。

つう どう さん  
**通 導 散**  
エキス細粒G「コタロー」

商品番号

D202

**通導散エキス細粒G「コタロー」**は、漢方<sup>おけつ</sup>でいう瘀血の改善に用いる漢方薬です。瘀血は一種の血液循環障害と考えられ、打撲や外傷に伴う内出血やうっ血も瘀血で、慢性的な一種の体質として瘀血がみられる場合もあります。この場合、自律神経や内分泌系との関係も示唆されています。

顔が赤いとか、唇や歯ぐきが暗赤色を帯びているといったことが、瘀血の目安となる場合もあります。また、ほかに便秘傾向、下腹部を押すと圧迫感がある、更年期にみられるようなイライラ、不安などの精神症状、からだの各部の痛みや凝りも一連の瘀血症状とみなされることがあります。本剤はこれらの緩和に効果があります。



**使用上の注意**



**してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください  
他の瀉下薬（下剤）
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください



**相談すること**

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください  
(1)医師の治療を受けている人。  
(2)妊婦または妊娠していると思われる人。  
(3)体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。  
(4)胃腸が弱く下痢しやすい人。  
(5)高齢者。  
(6)次の症状のある人。  
むくみ  
(7)次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、腎臓病
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があります  
ので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症 状            |
|------|----------------|
| 消化器  | はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称               | 症 状                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| 偽アルドステロン症、<br>ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 |

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください  
下痢
4. 1ヵ月位（便秘に服用する場合には5～6日間）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

## 【効能・効果】

体力中等度以上で、下腹部に圧痛があって便秘しがちなものの次の諸症：  
月経不順、月経痛、更年期障害、打ち身（打撲）、腰痛、便秘、高血圧の  
随伴症状（頭痛、めまい、肩こり）

## 【用法・用量】

食前または食間に服用してください。

食間とは……食後2～3時間を指します。

| 年 齢       | 1回量           | 1日服用回数 |
|-----------|---------------|--------|
| 大人（15歳以上） | 1包 または 3.2g   | 3回     |
| 15歳未満7歳以上 | 2/3包 または 2.1g |        |
| 7歳未満4歳以上  | 1/2包 または 1.6g |        |
| 4歳未満2歳以上  | 1/3包 または 1.1g |        |
| 2歳未満      | 服用しないでください    |        |

（大入り剤に添付のサジは、すり切り一杯で約0.6gです）

## 〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。


## 【成分・分量】

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 成分・分量 本剤3包（9.6g）中         |                |                |
| トウキ……………2.40g             | コウボク……………1.60g | コウカ……………1.60g  |
| ダイオウ……………2.40g            | チンピ……………1.60g  | ソボク……………1.60g  |
| 無水硫酸ナトリウム…1.44g           | モクツウ……………1.60g | カンゾウ……………1.60g |
| キジツ……………2.40g             |                |                |
| より抽出した水製エキス5.20gを含有しています。 |                |                |

添加物としてステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、プルラン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウムを含有しています。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- （1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- （2）小児の手の届かない所に保管してください。
- （3）他の容器に入れ替えないでください。  
（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）
- （4）水分が付きますと、品質の劣化をまねきますので、誤って水滴を落したり、ぬれた手で触れないでください。
- （5）1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。  
（分包剤のみ）
- （6）湿気などにより薬が変質することがありますので、服用後は、ビンのフタをよくしめてください。  
（大入り剤のみ）
- （7）使用期限を過ぎた商品は服用しないでください。
- （8）ビンの「開封年月日」記入欄に、ビンを開封した日付を記入してください。  
（大入り剤のみ）



湿気注意

本剤は生薬を原料としていますので、商品により多少色が異なることがあります。品質・効果に変わりはありません。

商品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部 お客様相談室

大阪市北区中津2丁目5番23号 TEL06(6371)9106

受付時間 9:00～17:30(土、日、祝日を除く)

漢方薬ガイド  
請求券



D202 A26

左のシールをハガキに貼って、お買求めの店名、住所、氏名、年齢、職業、電話番号、症状をお書きをえのうえ、お申込みください。漢方薬と食養を詳しく説明した、パンフレットをお送りいたします。

製造販売元 漢方をよりよく より多くの人に



小太郎漢方製薬株式会社

〒531-0071 大阪市北区中津2丁目5番23号  
TEL 06 (6371) 9106