

第2類医薬品

漢方製剤



中国の民間説話「白蛇伝」に登場する女性を伝統的な漢方のイメージとしてシンボルマークとしたものです。

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。また必要な時に読めるように大切に保管してください。

# 柴葛解肌湯

エキス細粒G「コタロー」

商品番号

D265

「風邪は万病のもと」とよくいわれます。一般に風邪をひいてもすぐに治ることが多いですが、風邪くらいと軽くみていると、長引いて体力を消耗して、他の病気にかかってとりかえしのつかないこともあり、このようにいわれています。

いわゆる風邪（感冒）は、種々の原因で起こる呼吸器系炎症の総称で、鼻炎やノドの痛み、咳などの上気道炎の症状の他に、悪寒、発熱、疲労倦怠などの全身症状を伴うこともあります。薬も飲まず休養と栄養だけで治る鼻かぜなどの軽い風邪から、高熱を発して悪寒、頭痛があり、四肢の関節が痛み、全身倦怠感を訴えるなど、全身に激しい症状がでるインフルエンザ様症状までさまざまです。

柴葛解肌湯エキス細粒G「コタロー」は、このような風邪の激しい症状に適した漢方薬です。風邪はこじらせないためにも、早めの治療が大切です。高齢者や妊婦、幼児など抵抗力が劣っている方は、特に注意してください。



## 使用上の注意



### してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

次の人は服用しないでください

生後3ヵ月未満の乳児。



### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦または妊娠していると思われる人。
  - 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
  - 胃腸の弱い人。
  - 発汗傾向の著しい人。
  - 高齢者。
  - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
  - 次の症状のある人。  
むくみ、排尿困難
  - 次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

- 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください  
下痢
- 5～6日間（発熱、悪寒、頭痛、はきけに服用する場合には5～6回）服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

（裏面につづく）

## 【効能・効果】

体力中等度以上で、激しい感冒様症状を示すものの次の諸症：  
発熱、悪寒、頭痛、四肢の痛み、全身倦怠、口渇、食欲不振、はきけ、鼻腔乾燥、不眠

## 【用法・用量】

食前または食間に服用してください。  
食間とは……食後2～3時間を指します。

年齢	1回量	1日服用回数
大人（15歳以上）	1包 または 2.5g	3回
15歳未満7歳以上	2/3包 または 1.7g	
7歳未満4歳以上	1/2包 または 1.3g	
4歳未満2歳以上	1/3包 または 0.8g	
2歳未満	1/4包 または 0.6g	

（大入り剤に添付のサジは、大が1.0g、小が0.1gの計量用となっております）

## ＜用法・用量に関連する注意＞

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2)1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

## 【成分・分量】


成分・分量 本剤3包（7.5g）中		
サイコ……………	4.0g	オウゴン…………… 2.4g ショウキョウ …… 0.4g
カクコン……………	3.2g	シャクヤク …… 2.4g カンゾウ…………… 1.6g
マオウ……………	2.4g	ハンゲ…………… 3.2g セッコウ…………… 6.4g
ケイヒ……………	2.4g	

より抽出した水製エキス4.2gを含有しています。

添加物として含水二酸化ケイ素、ステアリン酸マグネシウム、アメ粉を含有しています。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。  
（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）
- (4)水分が付きますと、品質の劣化をまねきますので、誤って水滴を落したり、ぬれた手で触れないでください。
- (5)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。  
（分包剤のみ）
- (6)湿気などにより薬が変質することがありますので、服用後は、ビンのフタをよくしめてください。  
（大入り剤のみ）
- (7)使用期限を過ぎた商品は服用しないでください。
- (8)ビンの「開封年月日」記入欄に、ビンを開封した日付を記入してください。  
（大入り剤のみ）



湿気注意

本剤は生薬を原料としていますので、商品により多少色が異なることがあります。品質・効果に変わりはありません。

商品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部 お客様相談室  
大阪市北区中津2丁目5番23号 TEL06(6371)9106  
受付時間 9:00～17:30(土、日、祝日を除く)

漢方薬ガイド  
請求券



D265 A25

左のシールをハガキに貼って、お買求めの店名、住所、氏名、年齢、職業、電話番号、症状をお書きそえのうえ、お申込みください。漢方薬と食養を詳しく説明した、パンフレットをお送りいたします。

製造販売元 漢方をよりよく より多くの人に



小太郎漢方製薬株式会社

〒531-0071 大阪市北区中津2丁目5番23号  
TEL 06 (6371) 9106