

Medicine for
Constipation

便秘薬

服用に際して、この説明書きを必ずお読みください
また必要ときに読めるよう大切に保管してください
使用期限を過ぎた製品は服用しないこと

販売名:丸薬七ふく

第2類医薬品

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる) 1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと: 他の瀉下薬(下剤) 2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳をさけること 3. 大量に服用しないこと

👨‍⚕️ 相談すること 1. 次の人は服用前に医師・薬剤師又は登録販売者に相談すること(1) 医師の治療を受けている人(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人(4) 次の症状のある人: はげしい腹痛、吐き気・嘔吐 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師・薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この箱を持って医師・薬剤師又は登録販売者に相談すること: 下痢 4. 1週間位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この箱を持って医師・薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

○便秘

○便秘に伴う次の症状の緩和:

頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振(食欲減退)、腹部膨満、腸内異常醗酵、痔

用法・用量

次の量を朝夕の空腹時に水又はお湯で服用してください。ただし、便秘の症状には個人差がありますので、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量してください

年 齢	1回量	服用回数
大人(15才以上)	15～30粒	1日2回
11才以上15才未満	10～20粒	
7才以上11才未満	7～15粒	
5才以上7才未満	5～10粒	
5才未満	× 服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

(1) 定められた用法・用量を厳守すること(2) 吸湿しやすいため、服用のつどキャップをしっかりとめること(3) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること●小さな丸薬ですので服用量を細かく調節できます。服用は空腹時・就寝前が効果的です通常服用後8~12時間位でころよいお通じがございます●空腹時の目安: 食後なるべく2時間以上

成分・分量 60粒中

ダイオウ末1000mg、アロエ末340mg、ケンゴシ末200mg、オウレン末100mg、オウゴン末200mg、センキュウ末760mg、サンキライ末1000mg
添加物として、バレイショデンプン、寒梅粉を含有する

●本剤は天然物(生薬)を用いているため、丸薬の色が多少異なることがあります

●丸薬の大きさや形は製造工程により多少不揃いであることがあります

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

あったらいいな
をカタチにする
小林製薬

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 本剤をぬれた手で扱わないこと

製品のお問合せは、お買い求めのお店又は
お客様相談室にお願いいたします。

発売元 小林製薬株式会社

〒541-0045 大阪府中央区道修町4-4-10

小林製薬 お客様相談室

0120-5384-01

9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 小林製薬株式会社

〒562-0029 大阪府箕面市彩都葉生北4-4-66

MADE IN JAPAN