

販売名:
小林タムシチンキb
Medicine for Athlete's Foot

第2類医薬品

効能・効果

みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

用法・用量

1日数回患部に適量を塗布してください

＜用法・用量に関連する注意＞

(1) 患部やその周囲が汚れたまま使用しないこと (2) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けること (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること (4) 外用にのみ使用すること

成分・分量100mL中

ミコナゾール硝酸塩… 1g、サリチル酸… 4g、
イソプロピルメチルフェノール… 0.3g、クロ
ルフェニラミンマレイン酸塩… 0.2g、リド
カイン… 2g、dl-カンフル… 1.5g
添加物として、エタノールを含有する

製品のお問
合せは、お買
い求めのお
店又はお客
様相談室に
お願いいた
します

▼あつらいいな/をカタチにする▼

発売元 小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

小林製薬 お客様相談室

0120-5884-01

9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

製造販売元 小林製薬株式会社
〒562-0029 大阪府箕面市彩都粟生北4-66

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないこと

(1) 目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、
膈等)、陰のう、外陰部等 (2) 湿疹 (3)
湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登
録販売者に相談すること

(1) 医師の治療を受けている人 (2) 乳幼
児 (3) 薬などによりアレルギー症状を起
こしたことがある人 (4) 患部が顔面又は
広範囲の人 (5) 患部が化膿している人 (6)
「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜ
にたむし」かがはっきりしない人 (陰のう
にかゆみ、ただれ等の症状がある場合は、
湿疹等他の原因による場合が多い)

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副
作用の可能性があるので、直ちに使用を
中止し、このパッケージを持って医師、
薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係 部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、 はれ、刺激感、落屑、ただれ、 乾燥・つっぱり感、水疱

使用に際して、この説明書きを必ず
読むこと。また必要ときに読める
よう大切に保管すること。使用期限
(パッケージ底面及び容器底面に記
載)を過ぎた製品は使用しないこと

3. 2週間位使用しても症状がよくなら
ない場合は使用を中止し、このパッ
ケージを持って医師、薬剤師又は登録
販売者に相談すること

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼
しい所に密栓して保管すること (2) 小児の
手の届かない所に保管すること (3) 他の容
器に入れ替えないこと (誤用の原因になっ
たり品質が変わる) (4) 火気に近づけない
こと (エタノール含有物) ●使用期限内であ
っても開封後は品質保持の点からなるべく
早く使用すること ●本剤は合成樹脂等を軟
化したり、塗料を溶かすことがあるため、家
具や床等につかないようにすること

●ハケ付で患部に塗りやすい●

火気厳禁 第一石油類 危険等級Ⅱ
エタノール含有物 水溶性

副作用被害救済制度 MADE IN JAPAN
☎ 0120-149-931

税 控除 対象