

## のど用殺菌消毒薬

販売名：のどぬーるスプレーB  
 (効能・効果) のどの殺菌・消毒  
 (用法・用量) 1日数回、適量を患部に噴射してください

## &lt;用法・用量に関連する注意&gt;

(1)ノズルをのどの患部にのけて、軽く息をはきながら噴射すること(息を吸いながら使用すると、液が気管支や肺に入ることがある)(2)小児に使用させる場合には特に注意し、保護者の指導監督のもとに使用させること(3)目に入らないように注意すること(4)のど用には特に注意すること(5)薬液を誤って大量に飲み込んだときは、直ちに医師の診療を受けること

## 〔成分・分量〕100mL中

ヨウ素……………0.5g  
 添加物として、ヨウ化K、グリセリン、  
 プロピレングリコール、D-ソルビトール、  
 エタノール、l-メントール、香料を含有する

## △使用上の注意

## ※(してはいけないこと)

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと (1)本剤又は本剤の成分、ヨウ素(ポビドンヨード)によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (2)甲状腺疾患のある人 (3)2才未満の乳幼児 (4)妊婦又は妊娠していると思われる人 (5)授乳中の人
2. 長期連用しないこと
3. 大量に噴射しないこと

## ※(相談すること)

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人 (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (3)次の症状のある人：口内のひどいだれ
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、このパッケージを持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症 状            |
|------|----------------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ      |
| 口    | あれ、しみる、灼熱感、刺激感 |
| 消化器  | 吐き気            |
| その他  | 不快感            |

まれに下記の重篤な症状が起こることがある  
 その場合は直ちに医師の診療を受けること

| 症状の名称          | 症 状                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| ショック(アナフィラキシー) | 使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる |

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、このパッケージを持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

MADE IN JAPAN

使用に際して、この説明書きを必ずお読みください。また必要に応じて読めるよう大切に保管してください。使用期限(パッケージ底面及び容器ラベルに記載)を過ぎた製品は使用しないこと

## 〔保管及び取扱い上の注意〕

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に、キャップをしっかりと立てて保管すること(2)小児の手の届かない所に保管すること(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)

●使用後は、必ずキャップをしっかりと閉めて、ノズルをもとの位置にもどして保管すること●携帯する場合は、添付のビニール袋に入れること●使用中に薬液がこぼれ衣類等が着色したら、すぐに水洗いすること●液が出ないときは、液が出るまでくり返し押すこと。またノズルの先端を針等で突かないこと

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

## ＼あったらいいな／をカタチにする

発売元 小林製薬株式会社  
 〒541-0045 大阪府中央区道修町4-4-10

小林製薬 お客様相談室

0120-5884-01

9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 小林製薬株式会社  
 〒562-0029 大阪府箕面市彩都葉生北4-4-66