

使用に際して、この添付文書を必ずお読みください
また必要なときに読めるよう大切に保管してください
使用期限(パッケージ側面およびチューブ底に記載)を過ぎた製品は使用しないこと

冷感&パウダー配合で
サラサラにして治す

タムチンキ^P
パウダーinジェル

販売名:タムチンキ P

みずむし・たむし用薬 第2類医薬品

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないこと

- (1) 目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膣など)、陰のう、外陰部など
- (2) 湿疹
- (3) 湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 乳幼児
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (4) 患部が顔面または広範囲の人
- (5) 患部が化膿している人
- (6) 「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人
(陰のうにかゆみ・ただれなどの症状がある場合は、湿疹など他の原因による場合が多い)

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関 係 部 位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感

3. 2週間くらい使用しても症状がよくなりえない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

効能・効果

みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

(裏面につづく)

用法・用量

1日1回、患部に適量を塗布してください

＜用法・用量に関連する注意＞

(1)患部やその周囲が汚れたまま使用しないこと

(2)目に入らないように注意すること

万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けること

(3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること

(4)外用にのみ使用すること

その他の注意

●クリーム様に白くなっていますが、サラサラ感や速乾性にこだわってパウダーをたっぷり配合した白色のジェル処方です

●手に残った白色のジェルは、水や石鹸で洗い流してください

成分・分量 100g中

成分	分量	はたらき
オキシコナゾール硝酸塩	1 g	白せん菌を殺菌して、患部の治癒を促進する
リドカイン	2 g	みずむし、たむしに伴うかゆみを鎮める
グリチルレチン酸	0.5 g	炎症を鎮める
l-メントール	1 g	清涼感を与えて、かゆみをやわらげる

添加物として、カルボキシビニルポリマー、トウモロコシデンプン、酸化チタン、タルク、BHT、ジプロピレングリコール、エタノールを含有する

保管および取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに密栓して保管すること

(2)小児の手の届かないところに保管すること

(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)

(4)火気に近づけないこと(エタノール含有物)

製品のお問合せは、お買い求めのお店またはお客様相談室にお願いいたします

発売元 **小林製薬株式会社**

〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

小林製薬 お客様相談室

0120-5884-01

9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 **小林製薬株式会社**

〒562-0029 大阪府箕面市彩都薬生北4-1-66

MADE IN JAPAN