

使用に際して、この添付文書を必ずお読みください
また必要なときに読めるよう大切に保管してください
使用期限を過ぎた製品は使用しないこと

股間・内股などのかゆみ、かぶれに

ラナケイン ムズメン

しみないクリームタイプ (ムれる・汗の刺激・下着で擦れる)

販売名: ムズメン 非ステロイド剤 鎮痒消炎薬 第2類医薬品

- ① リドカインが、ツライかゆみを素早く鎮めます
- ② ジフェンヒドラミン塩酸塩がかゆみの発生を抑えます
- ③ トラブルの元となる雑菌の発生を抑えます
- ④ 低刺激性で肌にやさしくしみません


■■■■ 下記のような症状などにお使いいただけます ■■■■

●ムレや汗の刺激によるかゆみ

股間・内股はムレて雑菌が繁殖しやすく、汗も多くかきやすいため、かゆくなります

●下着の擦れによるかゆみ

股間・内股の肌は刺激に非常に敏感なので、下着との擦れによってもかゆくなります



⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
次の部位には使用しないこと: 目や目の周囲、粘膜等



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(4) 湿潤やただれのひどい人 (5) 乳幼児
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

- 5~6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

(裏面につづく)

効能・効果

かゆみ、かぶれ、湿疹、あせも、ただれ、皮ふ炎、じんましん、虫さされ、しもやけ

用法・用量

1日数回、患部に適量を塗布してください

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること
 - (2) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けること
 - (3) 外用にのみ使用すること
- 同じ患部に他の外用剤との併用はさけること
 - 患部やその周囲が汚れたまま使用しないこと

成分・分量 100g中

成 分	分量	はたらき
リドカイン	2.0g	(局所麻酔剤)かゆみを素早く鎮める
ジフェンヒドラミン塩酸塩	2.0g	(抗ヒスタミン剤)かゆみの発生を止める
イソプロピルメチルフェノール	0.1g	(殺菌剤)トラブルの元となる雑菌の発生を抑える
トコフェロール酢酸エステル	0.3g	(ビタミンE)新陳代謝を高め、患部の治りを早める

添加物として、ステアリン酸グリセリン、ポリソルベート60、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、パラベン、ステアリルアルコール、セタノール、プロピレングリコール、カルボキシビニルポリマー、セバシン酸ジエチル、2,2',2"-ニトリロトリエタノールを含有する

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)

- 陰のうに起こるかゆみは、ほとんどの場合いんきんたむしが原因ではありません
- いんきんたむしは、内股の付け根で起こることが多く、赤い小さなぼつぼつができて、同心円状に広がり、激しいかゆみを伴うことがあります
- 5～6日間使用しても症状の改善が見られない場合には、いんきんたむし等の可能性があります。いんきんたむしが疑われる場合には、医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

発売元 **小林製薬株式会社**
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

小林製薬 お客様相談室
0120-5884-01
9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 **小林製薬株式会社**
〒562-0029 大阪府箕面市彩都薬生北4-66

MADE IN JAPAN