

特徴

1. ジュクジュク水虫を乾燥

パウダーがジュクジュクした患部をサラサラに乾燥させます

2. 1日1回でしっかり殺菌

1日1回の使用で殺菌成分「フテナフィン塩酸塩」がしっかり殺菌し、水虫を治します

3. つらいかゆみに効く

かゆみ止め成分「リドカイン」が、水虫のかゆみをすばやく鎮めます

販売名:

タムデンキパウダースプレー Z

Powder Medicine for Athlete's Foot

水虫・たむし用薬

第②類医薬品

効能・効果

みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

用法・用量

1日1回、適量を患部に噴霧してください
(用法・用量に関連する注意)

- (1)患部やその周囲が汚れたまま使用しないこと
- (2)目に入らないように注意すること
万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けること
- (3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること
- (4)外用にのみ使用すること
- (5)使用前によく振ること
- (6)患部まで約3cmの距離で噴射すること
- (7)皮膚傷等の恐れがあるので、同じ箇所に連続して約1分以上噴射しないこと
 - 用法・用量を厳守すること
 - 直接吸い込まないように注意すること

成分・分量

100g中

成分	分量
フテナフィン塩酸塩	200mg
リドカイン	500mg
グリチルレチン酸	200mg
l-メントール	200mg
ベンザルコニウム塩化物	10mg

添加物として、ミリスチン酸イソプロピル、エタノール、タルク、酸化チタン、トウモロコシデンプン、BHT、DMEを含有する

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

使用に際して、この説明書きを必ずお読みください。また必要なときに読めるよう大切に保管してください

使用期限(パッケージ底面及び缶底に記載)を過ぎた製品は使用しないこと

△使用上の注意

⊗(してはいけないこと)

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 次の部位には使用しないこと

- (1)目や目の周囲、顔面、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膈等)、陰のう、外陰部等
- (2)湿疹
- (3)湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部



⊗(相談すること)

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1)医師の治療を受けている人
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3)乳幼児
- (4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (5)患部が広範囲の人
- (6)患部が化膿している人
- (7)「湿疹」が「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」ががはっきりしない人(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等の原因による場合が多い)

- 末梢血行障害がある、又はあられると思われる人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、このパッケージを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感、落屑、ただれ、水泡、亀裂

3. 2週間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、このパッケージを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

タムデンキ® パウダースプレー

第②類医薬品

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にキャップをしっかりとめて保管すること
- (2)小児の手の届かない所に保管すること
- (3)火気に近づけないこと
 - 本剤のついた手で、目や粘膜に触れないこと
 - 本剤は合成樹脂等を軟化したり、塗料を溶かすことがあるため、家具や床等につかないようにすること

火気と高温に注意

- 捨てるときには、火気のない戸外で噴射音が消えるまでボタンを押してガスを抜き、捨てること

高圧ガス：DME

火気厳禁 第一石油類 危険等級Ⅱ

エタノール含有物 14g

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

▼あったらいいな／をカタチにする

発売元 **小林製薬株式会社**
〒541-0045 大阪市中央区区道修町4-410

製品のお問合せ先 (お客様相談室)

0120-5884-01

9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

製造販売元

小林製薬株式会社

〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

税 控除 対象