

指定医薬部外品

Throat Antiplogistic 口腔咽喉炎

販売名: のどぬーるスプレー クリアミント a

〔効能・効果〕のどの炎症によるのどの痛み・のどのはれ・のどのあれ・のどの不快感・声がれ

〔用法・用量〕1日数回、適量ののどの粘膜面に噴射塗布してください

＜用法・用量に関連する注意＞

(1) ノズルをのどの患部に向けて、軽く息をはきながら噴射すること(息を吸いながら使用すると、液が気管支や肺に入ることがある)
(2) 大量に噴射しないこと
(3) 小児に使用させる場合には特に注意し、保護者の指導監督のもとに使用させること
(4) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること
(5) のど用におみ使用する(6) 薬液を誤って大量に飲み込んだときは、直ちに医師の診療を受けること

〔成分・分量〕100mL中
セチルピリジニウム塩化物水和物……………0.3g
添加物として、D-ソルビトール、l-メントール、香料、ポビドン、エタノール、グリセリン、プロピレングリコールを含有する

使用に際して、この説明書きを必ずお読みください。また必要ときに読めるように大切に保管してください。使用期限(パッケージ底面及び容器ラベルに記載)を過ぎた製品は使用しないこと

△ 使用上の注意

⊗(してはいけないこと)

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる) 長期連用しないこと

Ⓜ(相談すること)

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談すること

(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(3) 次の症状のある人: 口内のひどいだれ

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、このパッケージを持って医師又は薬剤師に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	胃部不快感、吐き気

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、このパッケージを持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談すること

4. 使用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強がみられた場合には、使用を中止し、このパッケージを持って医師又は薬剤師に相談すること
口の刺激感

〔保管及び取扱い上の注意〕

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に、キャップをしっかりとめて立てて保管すること(2) 小児の手の届かない所に保管すること(3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)(4) 火気に近づけないこと(プロピレングリコール含有物)

●使用後は、必ずキャップをしてノズルをもとの位置にもどして保管すること●携帯する場合は、添付のビニール袋に入れること●液が出ないときは、液が出るまでくり返し押すこと。またノズルの先端を針等で突かないこと

火気厳禁 第二石油類 危険等級Ⅲ
プロピレングリコール含有物 水溶性

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

＼あったらいいな／をカタチにする

発売元 **小林製薬株式会社**
〒541-0045 大阪府中央区道修町4-4-10

小林製薬 お客様相談室

0120-5884-06

9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 **小林製薬株式会社**
〒562-0029 大阪府箕面市彩都業生北44-66

MADE IN JAPAN