

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください
また必要なときに読めるよう大切に保管してください
使用期限（パッケージの側面に記載）を過ぎた製品は服用しないこと

へんとうせん
扁桃腺のはれ・痛みに ハレナース®

販売名：ハレナース

口腔・咽喉用薬 第3類医薬品

製品特徴

- トラネキサム酸とカンゾウエキスの2つの抗炎症成分が、扁桃腺のはれを鎮めます
- 水なしでも飲めて、患部に気持ちいい冷感がとどきます

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと
 - (1) 甘草（カンゾウ）又はその主成分グリチルリチンを含有する内服薬
(むくみ、血圧上昇及び筋疾患(ミオパチー)等が起きることがある)
 - (2) トラネキサム酸を含有する内服薬
(鼻炎用内服薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮咳去痰薬等)
2. 長期連用しないこと

💊 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 高齢者
 - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (5) 次の症状のある人：むくみ
 - (6) 次の診断を受けた人：高血圧、心臓病、腎臓病、血栓のある人（脳血栓、心筋梗塞、血栓静脈炎等）、血栓症を起こすおそれのある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症 状 |
|-------|-------------------------------------|
| 皮ふ | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 吐き気・嘔吐、胸やけ、食欲不振もしくは食欲増進、胃部不快感、胃部膨満感 |
| 精神神経系 | めまい |
| その他 | 頻尿 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること

| 症状の名称 | 症 状 |
|-----------------|--|
| 偽アルドステロン症、ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる |

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
下痢
4. 5~6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

扁桃炎(のどのはれ、のどの痛み)・咽頭炎、口内炎

用法・用量

次の量を朝昼晩に服用してください

| 年齢 | 1回量 | 服用回数 |
|-----------|-----------|------|
| 大人(15才以上) | 1包 | 1日3回 |
| 7才以上15才未満 | 1/2包 | |
| 7才未満 | × 服用しないこと | |

<用法・用量に関する注意>

- (1) 定められた用法・用量を厳守すること
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること
- 水なしでも服用できます

成分・分量 1日量(3包:3.9g) 中

| | |
|---|--------------------|
| トラネキサム酸 | 750mg |
| カンゾウエキス | 198mg(原生葉換算量990mg) |
| ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆) | 50mg |
| リボフラビン(ビタミンB ₂) | 12mg |
| L-アスコルビン酸ナトリウム(ビタミンCナトリウム) | 500mg |
| 添加物として、エリスリトール、アルファー化デンプン、二酸化ケイ素、タルク、カラメル、無水ケイ酸、L-メントール、香料を含有する | |

<成分・分量に関する注意>

- (1) 本剤に配合されているリボフラビン(ビタミンB₂)により、尿が黄色になることがあります
- (2) 本剤の服用により、尿及び便の検査値に影響を与えることがあります
医師の検査を受ける場合は、ビタミンCを含有する製剤を服用していることを医師に知らせてください
- 本剤は天然物(生薬)を用いているため、顆粒の色が多少異なることがあります

有効成分のはたらき

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| トラネキサム酸 | 抗炎症作用があり、のどのはれ・痛み等の症状を改善します |
| カンゾウエキス | 主成分グリチルリチン酸の抗炎症作用で、のどのはれ・痛み等を改善します |
| ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆) | 粘膜の機能を正常に働かせる作用があります |
| リボフラビン(ビタミンB ₂) | |
| L-アスコルビン酸ナトリウム(ビタミンCナトリウム) | 体力消耗時のビタミンC補給になります |

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 1包を分割して服用する場合、残った薬剤は袋の口を折り返して保管すること
また、保管した残りの薬剤はその日のうちに服用するか捨てること

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

発売元 小林製薬株式会社

〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10
ホームページ <http://www.kobayashi.co.jp>

製品のお問合せ先(お客様相談室)

0120-5884-01

受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 小林製薬株式会社

〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

MADE IN JAPAN