

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください
また必要なときに読めるよう大切に保管してください
使用期限を過ぎた製品は服用しないこと

夜間頻尿 などの 悩みに

ユリナール^a

販売名: ユリナールa

漢方製剤 第2類医薬品

製品特徴

- 9つの生薬が硬くなった膀胱をやわらかくして、おしっこをためるなどの機能を改善する医薬品です
- 胃腸が弱い方にも服用いただけます
- 1日2回(朝・夕など)の食前又は食間に服用ください

※食前とは、食事の約30分前のことをいいます

※食間とは「食事と食事の間」を意味し、食後約2～3時間のことをいいます

使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

まれに下記の重篤な症状が起こることがある

その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄だん(皮ふや白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる

3. 1ヶ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

体力中等度以下で、胃腸が弱く、全身倦怠感があり、口や舌が乾き、尿が出しづるものの次の諸症: 頻尿、残尿感、排尿痛、排尿困難、尿のにごり、こしけ(おりもの)

(裏面につづく)

用法・用量

次の量を食前又は食間に水又はお湯で服用してください

年 齢	1回量	服用回数
大人(15才以上)	1包	1日2回
15才未満	× 服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- (1)定められた用法・用量を厳守すること
- (2)吸湿しやすいため、1回で服用すること

●食間とは「食事と食事の間」を意味し、食後約2～3時間のことをいいます

成分・分量 1日量(2包:3200mg)中

清心蓮子飲エキス…2238mg

レンニク……………3.5g	バクモンドウ……………2.1g
ブクリョウ……………2.8g	ニンジン……………3.5g
シャゼンシ……………2.1g	オウゴン……………2.1g
オウギ……………2.8g	ジコッピ……………2.1g
カンゾウ……………0.7g	より抽出

添加物として、ケイ酸Al、マクロゴール、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、タルク、無水ケイ酸、プロピレングリコール、バニリン、エチルバニリン、香料を含有する

●本剤は天然物(生薬)を用いているため、顆粒の色が多少異なることがあります

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること
- (2)小児の手の届かない所に保管すること
- (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

発売元 小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

小林製薬 お客様相談室
0120-5884-01
9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 小林製薬株式会社
〒562-0029 大阪府箕面市彩都栗生北41-66

10232599

MADE IN JAPAN

1CD-***F