

使用に際して、この添付文書を必ずお読みください
また必要な時に読めるよう大切に保管してください
使用期限(パッケージ底面およびチューブ底に記載)を過ぎた製品は
使用しないこと

第2類医薬品



かゆくてつらいしもやけに
シモアキュア®

販売名:シモアキュア
しもやけ・
あかぎれ用薬

特徴

1. かゆくてつらい、しもやけをしっかり治す軟膏タイプの塗り薬です
2. 血行促進成分「ヘパリン類似物質」が、しもやけの原因である滞った血流の循環を改善し、しもやけを元から治していきます
3. かゆみ止め成分「ジフェンヒドラミン」が、しもやけによるかゆみを素早く鎮めます

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと
(1) 出血性血液疾患(血友病、血小板減少症、紫斑病など)の人 (2) わずかな出血でも重大な結果をきたすことが予想される人(血液凝固抑制作用を有し出血を助長するおそれがある) (3) アトピー性皮膚炎の人(軽い症状であっても医師の下で適切な治療を受ける必要がある)
2. 次の部位には使用しないこと 目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膣など)



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (3) 湿潤やただれのひどい人 (4) 医師からアトピー性皮膚炎と診断されたことのある人
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

(裏面につづく)

効能・効果

しもやけ(ただれを除く)、手足のひび・あかぎれ、乾皮症、手指の荒れ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、小児の乾燥性皮膚、きず・やけどのあとの皮膚のしこり・つっぱり(顔面を除く)、打身・ねんざ後のはれ・筋肉痛・関節痛

用法・用量

1日1～数回、適量を患部にすりこむか、またはガーゼなどにのぼして貼ってください

<用法・用量に関連する注意>

(1)使用のつどキャップをしっかりとしめること (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること (3)目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること (4)外用にのみ使用すること

●出血のある傷口には使用しないこと(血が止まりにくくなることがある)

成分・分量 100g中

成分	分量	はたらき
ヘパリン類似物質	0.3g	(血行促進・皮膚保湿成分)末梢血管の血流量を増加させ、しもやけの原因である滞った血行を改善します 角質に潤いと柔軟性を与えます
ジフェンヒドラミン	0.5g	(抗ヒスタミン成分)かゆみの発生を抑えます
1-メントール	3.0g	(冷感刺激成分)冷感刺激によってかゆみ、灼熱感、ジンジン感を緩和します

添加物として、マクロゴール、BHT、リン酸、リン酸水素Naを含有する

保管および取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに密栓して保管すること
- (2)小児の手の届かないところに保管すること
- (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)

製品のお問合せは、お買い求めのお店またはお客様相談室にお願いいたします

発売元 **小林製薬株式会社**
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10
ホームページ <http://www.kobayashi.co.jp>

製品のお問合せ先(お客様相談室)
☎ **0120-5884-01**
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 **小林製薬株式会社**
〒567-0057 大阪府茨木市豊川11-30-3