

使用に際して、この添付文書を必ずお読みください
また必要なときに読めるよう大切に保管してください
使用期限（パッケージ側面およびチューブ底に記載）を過ぎた製品は使用しないこと

第2類医薬品

販売名：キュアレア^a

外用皮ふ・湿疹用薬

キュアレア^{®a}

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 湿潤やただれのひどい人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ、刺激感（ヒリヒリ感）、 熱感、乾燥感

3. 1～2週間くらい使用しても症状がよくなりえない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

（裏面につづく）

効能・効果

湿疹、皮ふ炎、かゆみ、かぶれ、ただれ、あせも、おむつかぶれ

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください

<用法・用量に関連する注意>

(1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること (2) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること (3) 外用にのみ使用すること (4) 患部を清潔にした後、塗布すること

成分・分量 100g 中

成 分	分 量	はたらき
ウフェナマート	5g	(抗炎症成分) 皮ふ刺激作用の弱い、非ステロイド性の抗炎症成分で、炎症部位に直接作用し、赤み・はれを鎮めます
ジフェンヒドラミン	1g	(抗ヒスタミン成分) かゆみの発生を抑えます
グリチルレチン酸	0.3g	(抗炎症成分) 赤み・はれを鎮めます

添加物として、2-メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン・メタクリル酸ブチル共重合体、流動パラフィン、グリセリン、1,3-ブチレングリコール、ステアリルアルコール、ステアリン酸ポリオキシシル、ワセリン、ステアリン酸グリセリン、キサンタンガム、ジメチルポリシロキサン、コレステロール、パラベン、エデト酸Na、ステアリン酸K、pH調節剤を含有する

保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに密栓して保管すること
- (2) 小児の手の届かないところに保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと (誤用の原因になったり品質が変わる)

製品のお問合せは、お買い求めのお店またはお客様相談室にお願いいたします

発売元 **小林製薬株式会社**

〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

ホ-ムページ <http://www.kobayashi.co.jp>

製品のお問合せ先 (お客様相談室)

0120-5884-01

受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

製造販売元 **小林製薬株式会社**

〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

MADE IN JAPAN 10142259