

- 飲酒翌日の酒残り(二日酔い)に効く漢方処方“茵陳五苓散”です
- アルコールの分解・代謝を促進し、酒残りを改善します
- 飲みやすい錠剤タイプです

吸湿しやすいため、服用のつどチャックをしっかりとしめること

服用に際して、この説明書きを必ずお読みください
使用期限(パウチ下部に記載)を過ぎた製品は服用しないこと

第2類医薬品

販売名: アルピタンγ (茵陳五苓散)

漢方製剤

⚠ 使用上の注意



相談すること 1 次の人又は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人

2. 服用後、右記の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、このパウチを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 1ヶ月位(嘔吐、二日酔い)に服用する場合には5～6回)服用しても症状がよくなるらない場合は服用を中止し、このパウチを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

※二日酔

成分・分量 1日量(8錠)中 茵陳五苓散料エキス 2.0 g

〔タクシャ3.0g、ブクリョウ2.25g、チョレイ2.25g、ビャクジュツ2.25g、
ケイヒ1.5g、インチンコウ2.0g〕より抽出

添加物として、無水ケイ酸、セルロース、トウモロコシデンプン、CMC、
クロスCMC-Na、ステアリン酸Mgを含有する

効能・効果 体力中等度以上をめやすとして、のどが渇いて、
尿量が少ないものの次の諸症：
嘔吐、じんましん、二日酔、むくみ

用法・用量 次の量を食前又は食間に水又はお湯で服用してください

年 齢	1回量	服用回数
大人(15才以上)	4錠	1日2回
15才未満	×	服用しないこと

<用法・用量に関連する注意>

定められた用法・用量を厳守すること

● 食間とは「食事と食事の間」を意味し、食後
約2～3時間のことをいいます

● 本剤は天然物(生薬)を用いているため、錠剤の色が多少異なることがあります

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい
所にチャックをしっかりとめて保管すること
(2) 小児の手の届かない所に保管すること
(3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因
になったり品質が変わる)
(4) 本剤をぬれた手で扱わないこと

製品のお問合せは、お買い求めのお店
又はお客様相談室にお願いいたします

発売元 小林製薬株式会社

〒541-0045 大阪府中央区道修町4-4-10

小林製薬 お客様相談室

0120-5884-01

9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 小林製薬株式会社

〒562-0029 大阪府箕面市彩都薬生北44-66

MADE IN JAPAN