服用に際して、この添付文書を必ずお読みください
また必要なときに読めるよう大切に保管してください
使用期限（パッケージ側面に記載）を過ぎた製品は服用しないこと

コエキュア
響声破笛丸

販売名：コエキュア

第２類医薬品
漢方製剤

特　徴

●乾燥、のどの使いすぎなどによる声がれ、のどの不快感を改善する医薬品です
●漢方処方「響声破笛丸」が声帯のダメージを修復し、声がれ、のどの不快感を改善します

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳をさけること

相談すること

1．次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
（1）医師の治療を受けている人
（2）妊婦又は妊娠していると思われる人
（3）体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）
（4）胃腸が弱く下痢しやすい人
（5）高齢者
（6）今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
（7）次の症状のある人
　むくみ
（8）次の診断を受けた人
　高血圧、心臓病、腎臓病

2．服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症　状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症　状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる

3．服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
　軟便、下痢

（裏面につづく）

4．5～6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

5．長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

しわがれ声、咽喉不快
注）体力に関わらず、使用できる

用法・用量

次の量を食前又は食間に水又はお湯で服用してください

年　齢	1回量	服用回数
大人（15才以上）	1包	1日3回
7才以上15才未満	2/3包	
7才未満	× 服用しないこと	

＜用法・用量に関連する注意＞
（1）定められた用法・用量を厳守すること
（2）小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること
●食間とは「食事と食事の間」を意味し、食後約2～3時間のことをいいます

成分・分量　1日量（3包：6.0g）中

響声破笛丸料エキス…3.5g

レンギョウ……2.5g	キキョウ……2.5g	カンゾウ……2.5g
ダイオウ……1.0g	シュクシャ……1.0g	センキュウ……1.0g
カシ……1.0g	アセンヤク……2.0g	ハッカ……4.0g

より抽出

添加物として、セルロース、ステアリン酸Mg、無水ケイ酸、プロピレングリコール、l-メントール、スクラロース、乳糖を含有する

●本剤は天然物（生薬）を用いているため、顆粒の色が多少異なることがあります

保管及び取扱い上の注意

（1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること
（2）小児の手の届かない所に保管すること
（3）他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる）
（4）1包を分割して服用する場合、残った薬剤は袋の口を2回以上折り返して保管すること
また、保管した残りの薬剤は、その日のうちに服用するか捨てること

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

発売元 **小林製薬株式会社**
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

小林製薬 お客様相談室
0120-5884-01
9:00～17:00（土・日・祝日を除く）

製造販売元 **小林製薬株式会社**
〒567-0057大阪府茨木市豊川1-30-3

MADE IN JAPAN　10170485