

Medicine for
Low Pressure Disorder

販売名: テイラック

漢方製剤

第2類医薬品

服用に際して、この説明書きを必ずお読みください。また必要なときに読めるよう大切に保管してください。使用期限を過ぎた製品は服用しないこと

△ 使用上の注意



相談すること 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人 2. 服用後、

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

右記の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 3. 1ヶ月位(急性胃腸炎、二日酔に服用する場合には5～6回、水様性下痢、暑気あたりに服用する場合には5～6日間)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果 体力に関わらず使用でき、のどが渇いて尿量が少ないもので、めまい、はきけ、嘔吐、腹痛、頭痛、むくみなどのいづれかを伴う次の諸症: 水様性下痢、急性胃腸炎(しづり腹注)のものには使用しないこと、暑気あたり、頭痛、むくみ、二日酔注「しづり腹」とは、残便感があり、くり返し腹痛を伴う便秘を催すものことである **用法・用量** 大人(15才以上) 1回4錠、5才以上15才未満 1回2錠、1日3回食前又は食間に水又はお湯で服用してください(5才未満は服用しないこと)

<用法・用量に関連する注意> (1) 定められた用法・用量を厳守すること (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること ●食間とは「食事と食事の間」を意味し、食後約2～3時間のことをいいます **成分・分量** 1日量(12錠)中 五苓散エキス 2.3g [タクシャ 5.0g、チョレイ・ブクリョウ・ビャクジュツ 各 3.0g、ケイヒ 2.0g より抽出] 添加物として、クロスCMC-Na、二酸化ケイ素、CMC-Ca、タルク、ステアリン酸Mg、セルロース、ヒプロメロース、マクロゴール、カルナウバロウを含有する ●本剤は天然物(生薬)を用いているため、錠剤の色が多少異なることがあります

副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931

MADE IN JAPAN

保管及び取扱い上の注意 (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること (2) 小児の手の届かない所に保管すること (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる) (4) 1包を分割して服用する場合、残った薬剤は袋の口を2回以上折り返して保管すること。また、保管した残りの薬剤は、その日のうちに服用するか捨てること

製品のお問合せは、お買い求めのお店
又はお客様相談室にお願いいたします

製造販売元 小林製薬株式会社
〒562-0029 大阪府箕面市杉都薬生44-66

▼ あったらいいな/をカタチにする

小林製薬 お客様相談室

発売元 小林製薬株式会社
〒544-0045 大阪府中央区道修町44-10

0120-5884-01

9:00～17:00(土・日・祝日を除く)