

指定医薬部外品 口腔咽喉薬  
Throat Antiphlogistic

販売名：KB 薬用マウススプレー

使用に際して、この説明書きを必ずお読みください  
また必要なときに読めるよう大切に保管してください  
使用期限(台紙下部に記載)を過ぎた製品は使用しないこと

### △ 使用上の注意

#### ☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)  
長期連用しないこと



#### ■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (3) 次の症状のある人: 口内のひどいだれ

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この台紙を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感、吐き気

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この台紙を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

4. 使用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強がみられた場合には、使用を中止し、この台紙を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること: 口の刺激感

**【効能・効果】** 口腔内の殺菌・消毒、口臭の除去、のどの炎症による声がれ・のどのあれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのはれ

**【用法・用量】** 大人(15才以上) 1回4噴射、5才~14才 1回3噴射、1日4~6回  
口腔内に噴射塗布してください (5才未満は使用しないこと)

<用法・用量に関する注意> (1) 噴射口を口に向けて、軽く息をはきながら噴射すること (息を吸いながら使用すると、液が気管支や肺に入ることがある) (2) 大量に噴射しないこと (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用されること (4) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うことなお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること (5) 口腔用又はのど用にのみ使用すること (6) 薬液を誤って大量に飲み込んだときは、直ちに医師の診療を受けること

**【成分・分量】** 100mL中 セチルピリジニウム塩化物水和物0.3g  
添加物として、D-ソルビトール、ポビドン、グリセリン、プロピレン glycol、エタノール、メントール、香料を含有する

**【保管及び取扱い上の注意】** (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にキャップをしっかりとしめて保管すること (2) 小児の手の届かない所に保管すること (3) 他の容器に入れ替えないこと (誤用の原因になったり品質が変わる)  
● 液が出ないときは、液が出るまで数回空押ししてください ● 温度が低いと液が出にくいことがあるため、その場合は手のひら等で温めてからご使用ください  
製品のお問い合わせは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

**火気厳禁** 第二石油類 危険等級Ⅲ プロピレン glycol含有物  
水溶性



: 台紙



外装フィルム  
ラベル、ボトル  
キャップポンプ

MADE IN JAPAN

\あつたらいいな/をカタチにする

使用期限  
(西暦年.月)

発売元 小林製薬株式会社

〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

製造番号

小林製薬 お客様相談室

0120-5884-05

9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 小林製薬株式会社

〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3