

口腔咽喉薬

販売名:ハレナースプレー

Medicine for Throat Pain and Swelling

第3類医薬品

使用に際して、この説明書きを必ずお読みください
また必要なときに読めるよう大切に保管してください
使用期限を過ぎた製品は使用しないこと

⚠ 使用上の注意

❌してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

長期連用しないこと

☎相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起すことがある人
- (3) 次の症状のある人: 口内のひどいただれ

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感、吐き気

3. 使用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、使用を中止し、この箱を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること: 口の刺激感

4. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

▼あったらいいな/をカタチにする

発売元 **小林製薬株式会社**
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

小林製薬 お客様相談室

0120-5884-01
9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願しいたします

製造販売元 **小林製薬株式会社**
〒562-0029 大阪府箕面市彩都東生4-4-66

効能・効果

のどの炎症によるのどの痛み・のどのはれ・のどのあれ・のどの不快感・声がれ、口内炎

用法・用量

1日数回、適量を患部に噴射塗布してください

〈用法・用量に関連する注意〉

(1) のどの炎症の場合には、ノズルをのどの患部にむけて、軽く息をはきながら噴射すること(息を吸いながら使用すると、液が気管支や肺に入ることがある)

(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用すること

(3) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること

(4) 噴射塗布のみに使用すること

(5) 薬液を誤って大量に飲み込んだときは、直ちに医師の診療を受けること

成分・分量 100mL 中

アズレンスルホン酸
ナトリウム水和物……………0.02g
セチルピリジニウム
塩化物水和物……………0.3g
添加物として、D-ソルビトール、プロピレングリコール、グリセリン、リン酸二水素Na、リン酸水素Na、エタノール、トメントールを含有する

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に、キャップをしっかりとめて立てて保管すること
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 火気に近づけないこと
- (5) 本剤使用後の一定の時間は、呼吸中に酒気帯び運転と判定される濃度以上のアルコール濃度が検出される可能性があるため、運転中の使用は控えること

●使用後は、必ずキャップをしてノズルをもとの位置にもどして保管すること

●携帯する場合は、添付のビニール袋に入れること

●使用中に薬液がこぼれ衣類等が着色したら、すぐに水洗いすること

●液が出ないときは、液が出るまでノズルを押し出すこと。またノズルの先端を針等で突かないこと

火気厳禁

第二石油類
危険等級Ⅲ
エタノール含有物
水溶性

副作用被害救済制度
☎0120-149-931

MADE IN JAPAN