

服用に際して、この説明書を必ずお読みください。また必要
なときに読めるよう大切に保管
してください。使用期限を過ぎ
た製品は服用しないこと

第2類医薬品

Medicine for Cough and Bronchial Asthma

販売名:ゴホナース
漢方製剤

⚠ 使用上の注意

相談すること 1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること(1)医師の治療を受けている人(2)妊婦又は妊娠していると思われる人(3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)(4)胃腸の弱い人(5)発汗傾向の著しい人(6)高齢者(7)次の症状のある人:むくみ、排尿困難(8)次の診断を受けた人:高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害 2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる

3.1ヶ月位(感冒に服用する場合には5~6日間)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 4.長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果 体力中等度以上で、せきが出て、ときにのどが渇くものの次の諸症:せき、小児ぜんそく、気管支ぜんそく、気管支炎、感冒、痔の痛み

用法・用量 大人(15才以上)1回3錠、1日2回食前又は食間に水又はお湯で服用してください(15才未満は服用しないこと)(用法・用量に関連する注意)定められた用法・用量を厳守すること●食間とは「食事と食事の間」を意味し、食後約2~3時間のことをいいます

成分・分量 1日量(6錠)中 麻杏甘石湯エキス 800mg [マオウ 2.0g、カンゾウ 1.0g、キョウニン 2.0g、セッコウ 5.0gより抽出] 添加物として、二酸化ケイ素、クロスCMC-Na、タルク、ステアリン酸Mg、セルロースを含有する ●本剤は天然物(生薬)を用いているため、錠剤の色が多少異なることがあります

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること(2)小児の手の届かない所に保管すること(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

＼あったらいいな／をカタチにする

発売元 小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

小林製薬 お客様相談室

0120-5884-01

9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 小林製薬株式会社
〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3