

使用に際して、この添付文書を必ずお読みください
また必要なときに読めるよう大切に保管してください
使用期限を過ぎた製品は使用しないこと

カユホホワイト

販売名:カユホホワイト

第②類医薬品 鎮痒消炎薬

⚠ 使用上の注意

 **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないこと

水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部

2. 顔面には、広範囲に使用しないこと

3. 長期連用しないこと

 **相談すること**

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

(1) 医師の治療を受けている人

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人

(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

(4) 患部が広範囲の人

(5) 湿潤やただれのひどい人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮ふ (患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

(裏面につづく)

効能・効果

湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん

用法・用量

1 日数回、適量を患部に塗布してください

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること
- (2) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること
- (3) 外用にのみ使用すること

成分・分量 100g 中

プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル 0.15g ジフェンヒドラミン塩酸塩 2g リドカイン 3g トコフェロール酢酸エステル 0.5g クロタミトン 5g イソプロピルメチルフェノール 0.1g トメントール 2.5g dl-カンフル 1g
添加物として、1,3-ブチレングリコール、セトステアリルアルコール、流動パラフィン、ワセリン、ジメチルポリシロキサン、トリイソオクタン酸グリセリン、ニコチン酸アミド、BHT、CMC-Na、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ステアリン酸ソルビタン、エデト酸 Na、パラベン、pH 調節剤、クエン酸 Na を含有する

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

発売元 **小林製薬株式会社**
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

小林製薬 お客様相談室
0120-5884-01
9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

製造販売元 **小林製薬株式会社**
〒562-0029 大阪府箕面市彩都栗生北44-66

MADE IN JAPAN

10235227