

販売名：アンメルツヨコココNEO

External Anti-Inflammatory / Analgesic

第2類医薬品 外用鎮痛消炎剤

△使用上の注意

❌してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと

(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (2) ぜんそくを起こしたことがある人 (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (4) 15才未満の小児

2. 次の部位には使用しないこと

(1) 目の周囲、粘膜等 (2) 皮ふの弱い部位 (顔、頭、わきの下等) (3) 湿疹、かぶれ、傷口 (4) みずむし、たむし等又は化膿している患部

3. 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎剤を使用しないこと

4. 長期連用しないこと



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

(1) 医師の治療を受けている人 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (3) 次の医薬品の投与を受けている人：ニューキノロン系抗菌剤

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、痛み、刺激感、熱感、皮ふのあれ、落屑 (フケ、アカのような皮ふのはがれ)、水疱、色素沈着

まれに下記の重篤な症状が起こることがある
その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮ふのかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる
接触 皮ふ炎、 光線 過敏症	塗布部に強いかゆみを伴う発疹・発赤、はれ、刺激感、水疱、たれ等の激しい皮ふ炎症状や色素沈着、白斑があらわれ、中には発疹・発赤、かゆみ等の症状が全身にひろがることもある。また、日光があたった部位に症状があらわれたり、悪化することがある

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

特 徴

① ジンジンという温かい感覚が、血行促進の作用のサイン!

② 鎮痛成分ジクロフェナクNaが患部に浸透し、肩こりの痛みを鎮めます

③ 3種の血行促進成分(ノナン酸パニリルアミド・トコフェロール酢酸エステル・ニコチン酸ベンジルエステル)を配合し、肩こりの痛みを原因*から改善します
※肩こりの痛みの原因の一つである血行不良

④ 背中まで届き使いやすいロングボトルです

ー[成分・分量]100g中ー

ジクロフェナクナトリウム 1g、トメントール 5g、トコフェロール酢酸エステル 0.1g、ノナン酸パニリルアミド 12mg、ニコチン酸ベンジルエステル 10mg
添加物として、グリチルリチン酸、ミリスチン酸イソプロピル、プロピレングリコール、ジプロピレングリコール、乳酸、エタノールを含有する

ー【用法・用量】ー

1日3～4回適量を患部に塗布してください。ただし、塗布部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないこと。なお、本成分を含む他の外用剤を併用しないでください

《用法・用量に関連する注意》

(1) 定められた用法・用量を厳守すること
(2) 本剤は、痛みやはれ等の原因となっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用すること
(3) 本剤は外用にのみ使用し、内服しないこと (4) 1週間あたり450gを超えて使用しないこと (5) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること (6) 使用部位に他の外用剤を併用しないこと (7) 通気性の悪いもの(ラップフィルム、矯正ベルト等)で使用部位を覆い、密封状態にしないこと●皮ふの特に弱い場合は、同じ所に続けて使用しないこと●スポーツや入浴等、汗をかき、前・後に使用した場合、ヒリヒリとした刺激、痛みや熱感が増すことがあります。これらの症状が強い場合は、石けんで洗い流すこと緩和します

使用に際して、この説明書きを必ずお読みください。また必要ときに読めるよう大切に保管してください

——【効能・効果】——

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手指の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所(冷暗所)にキャップをしっかりとめて箱に入れて立てて保管すること

(2) 火気に近づけないこと
(3) 小児の手の届かない所に保管すること
(4) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になり品質が変わる)
(5) 使用期限をすぎた製品は使用しないこと。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく速やかに使用すること

●キャップをしっかりとめないと液がもれることがある
●衣類に付着した場合には、各衣類の洗濯表示に従って、すみやかに洗うこと

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

▼あったらいいな/をカタチにする

発売元 小林製薬株式会社

〒541-0045 大阪府中央区道修町4-4-10

小林製薬 お客様相談室

0120-5884-01

9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 小林製薬株式会社

〒562-0029 大阪府箕面市彩都薬生北44-66

税 控 除 対 象

MADE IN JAPAN

火気厳禁 第一石油類 危険等級Ⅱ
エタノール含有物