

販売名：のどぬーるa
Medicine for Throat Pain

第3類医薬品

□口咽咽喉薬

使用に際して、この説明書きを必ずお読みください
また必要なときに読めるよう大切に保管してください

△使用上の注意 **×してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる) 次の人は使用しないこと
(1) 本剤又は本剤の成分、安息香酸エステルによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (2) メトヘモグロビン血症の診断を受けた人

■相談すること 1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐
精神神経系	眠気、不安、興奮、目のかすみ、めまい
その他	むくみ、皮膚が青っぽく見える、倦怠感、頭痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる ふるえ、けいれん

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

保管及び取扱い上の注意 (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること (2) 小児の手の届かない所に保管すること (3) 他の容器に入れ替えないこと (誤用の原因になったり品質が変わる) (4) アルミ袋を開封した後、使用した残りの薬剤は光や熱、湿気に注意し、変質したものは使用しないこと (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと

<トローチの取り出し方> 図のようにトローチの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出して使用すること (誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながる)



製品のお問合せは、
お買い求めのお店
又はお客様相談室に
お願いいたします

発売元 小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-40
小林製薬 お客様相談室
0120-5886-01
9:00～17:00 (土・日・祝日を除く)

製造販売元 小林製薬株式会社
〒562-0029 大阪府箕面市彩都葉生4-4-66

MADE IN JAPAN

効能・効果 のどの炎症によるのどの痛み・のどのはれ・声がれ・のどのあれ・のどの不快感、口腔内の殺菌・消毒

用法・用量 大人 (15才以上)
1回1錠、1日4～5回かまずに
口中でゆっくり溶かしてください
(15才未満は使用しないこと)

<用法・用量に関連する注意>
(1) 定められた用法・用量を厳守すること (2) かみ砕いたり、のみ込んだりしないこと

《おすすめのなめ方》 本品を舌の上で動かさないようにゆっくりなめると、効果感を得やすくなります。

成分・分量 5錠中 アミノ安息香酸エチル 10mg、セチルピリジニウム塩化物水和物 5mg、グリチルリチン酸二カリウム 12.5mg、アズレンスルホン酸ナトリウム 4mg 添加物として、イマル、グリセリン脂肪酸エステル、アセスルファムカリウム、L-メントール、dl-カンフル、香料を含有する

<成分・分量に関連する注意> 本剤の服用により、舌や口やのどに痺れる感覚がみられますが有効成分の作用なので問題ありません。服用後に舌やのどに痺れる感覚がみられる場合、飲み物や食べ物を取り込む際に注意すること

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

あたら
いなか
をカタチにする
小林製薬