

口腔咽喉薬

販売名:のどぬーるスプレーキッズd
(効能・効果)のどの炎症による
のどのあれ・のどのいたみ・のど
のはれ・のどの不快感・声がれ
(用法・用量)1日回数適量をのどの
粘膜面に噴射塗布してください

<用法・用量に関連する注意>

(1)ノズルをのどの患部に向けて、軽く息をはきながら噴射すること(息を吸いながら使用すると、液が気管支や肺に入ることがある)(2)小児に使用させる場合には特に注意し、保護者の指導監督のもとに使用させること(3)目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること(4)のど用にのみ使用すること(5)薬液を誤って大量に飲み込んだときは、直ちに医師の診療を受けること(成分・分量)100mL中
ボピドンヨード……………0.45g
添加物として、ヨウ化K、グリセリン、エタノール、クエン酸、クエン酸Na、香料を含有する

火気厳禁 第二石油類 危険等級Ⅲ
エタノール含有物 水溶性

副作用被害救済制度

☎0120-149-931

△ 使用上の注意

※ (してはいけないこと)

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

- 1.次の人は使用しないこと(1)本剤又は本剤の成分、ボピドンヨード(ヨウ素)によりアレルギー症状を起こしたことがある人(2)甲状腺疾患のある人(3)2才未満の乳幼児
2.長期連用しないこと 3.大量に噴射しないこと

※ (相談すること)

- 1.次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人(2)妊婦又は妊娠していると思われる人(3)授乳中の人(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人(5)次の症状のある人:口内のひどいだれ
2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消 化 器	吐き気
そ の 他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある
その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症 状
ショック(アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

MADE IN JAPAN

使用に際して、この説明書きを必ずお読みください。また必要ときに読めるよう大切に保管してください。使用期限を過ぎた製品は使用しないこと

〔保管及び取扱い上の注意〕

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に、キャップをしっかりとめて立てて保管すること(2)小児の手の届かない所に保管すること(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)

●使用後は、必ずキャップをしてノズルをもとの位置にもどして保管すること●携帯する場合は、添付のビニール袋に入れること●使用中に薬液がこぼれ衣類などが着色したら、すぐに水洗いすること●液が出ないときは、液が出るまでくり返し押すこと。またノズルの先端を針などで突かないこと

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

\\あつたらしいな/をカタチにする

発売元 小井製薬株式会社
〒541-0045 大阪府中央区道修町4-4-10

小井製薬 お客様相談室

0120-5884-01

9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 小井製薬株式会社
〒562-0029 大阪府箕面市彩都薬生北4-4-66