

ご使用に際して、外箱の説明文を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう商品と共に大切に保管して下さい。

⚠ 使用上の注意

■ 相談すること

1. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談すること
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
消化器	悪心・嘔吐

(2) 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合

2. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること
下痢

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
(2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
(3) 他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
(4) ビンのフタの締め方が不十分な場合、湿気などの影響で薬が変質することがありますので、服用のつどビンのフタをよく締めて下さい。
(5) 使用期限をすぎた製品は服用しないで下さい。

使用期限

製造番号

しみ、そばかす、
日やけによる
色素沈着

VITAMIN C CAPSULE
ビタミンCカプセル
「コバヤシ」

第3類医薬品 75カプセル

VITAMIN
C
CAPSULE



1カプセル中
日本薬局方ビタミンC
500mg

ビタミンCカプセル
「コバヤシ」

第3類医薬品 75カプセル

しみ、そばかす、日やけによる色素沈着



4 987336 701725

ビタミンCカプセル「コバヤシ」

第3類医薬品

【効 能】

- 次の諸症状の緩和：しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着
- 次の場合の出血予防：歯ぐきからの出血、鼻出血
「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談して下さい。」
- 次の場合のビタミンCの補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

【用法・用量】

次の量を、水又はぬるま湯で服用して下さい。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	1～2カプセル	1日2回 朝夕服用して下さい。
7才～14才	1カプセル	
7才未満	服用しないで下さい。	

＜用法・用量に関連する注意＞

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

【成分・分量】1カプセル中

アスコルビン酸（ビタミンC）……500mg

添加物：トウモロコシデンプン、ゼラチン、ラウリル硫酸Na

＜成分・分量に関連する注意＞

本剤の服用により、尿及び大便の検査値に影響を与えることがあります。医師の治療を受ける場合は、ビタミンCを含有する製剤を服用していることを医師に知らせて下さい。

製造販売元

小林薬品工業株式会社

岐阜県岐阜市中鷺1丁目139番地

本社所在地 東京都中央区日本橋箱崎町40番6号

お客様相談室 電話 058-278-3933

受付時間10時から16時まで（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度

☎0120-149-931

VITAMIN

C

CAPSULE



1カプセル中
日本薬局方ビタミンC
500mg

ビタミンCカプセル

「コバヤシ」

第3類医薬品

75カプセル

しみ、そばかす、日やけによる色素沈着