

この説明文書は服用前に必ずお読み下さい。また、
必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

ビタミンB₁ B₆ B₁₂ 主薬製剤 眼精疲労・肩こり・腰痛に

ユニベストBE

ユニベストBEは、ビタミンB₁誘導体（フルスルチアミン塩酸塩）、活性型ビタミンB₆、ビタミンB₁₂を中心に、神経・筋肉系に作用して神経痛、腰痛、肩こり、眼精疲労の緩和に優れた効果を発揮する錠剤です。

パントテン酸カルシウムとガンマーオリザノールがビタミンB₁、B₆、B₁₂の作用をサポートします。

肩こりの要因のひとつ、血行不良に対し、**天然型ビタミンE**と**ニコチン酸**の2成分が血行をよくし、疲労物質を除去することで、筋肉の痛みを改善します。

⚠ 使用上の注意



■ 相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
医師の治療を受けている人。
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、口内炎、食欲不振、 腹部膨満感、胃部不快感

(2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

- 生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがある。
出血が長く続く場合は、医師又は薬剤師に相談すること
- 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること
軟便、下痢、便秘

効 能

○次の諸症状の緩和：神経痛、筋肉痛・関節痛（腰痛、肩こり、五十肩など）、手足のしびれ、眼精疲労

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談して下さい。」

○次の場合のビタミンB₁B₆B₁₂の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

用法・用量

次の量を、食後すぐに、水またはお湯でかまずに服用して下さい。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人（15才以上）	2～3錠	1回
15才未満	服用しないで下さい。	

<用法・用量に関連する注意>

用法・用量を厳守して下さい。

成分・分量 3錠中

成 分 名	分 量	作 用
フルスルチアミン塩酸塩 (ビタミンB ₁ 誘導体)	109.16mg	吸収のよいビタミンB ₁ で、神経痛、手足のしびれ、眼精疲労などの症状を改善します。
リン酸ピリドキサル (活性型ビタミンB ₆)	60mg	体内で利用されやすいビタミンB ₆ で、神経の機能を正常に保ちます。
シアノコバラミン (ビタミンB ₁₂)	1500μg	末梢神経の機能を正常に保つ作用があります。
コハク酸d-α-トコフェロール (天然型ビタミンE)	100mg	末梢血管を拡張して血行をよくし、肩こり、手足のしびれの緩和に効果があります。
ニコチン酸	30mg	末梢部の血行をよくし、肩こり、手足のしびれの緩和に効果があります。
パントテン酸カルシウム	30mg	エネルギー産生に必要なビタミンです。
ガンマーオリザノール	10mg	自律神経の乱れをコントロールします。

添加物：乳酸Ca、カルメロースCa、ヒドロキシプロピルセルロース、メチルセルロース、ステアリン酸Mg、ケイ酸Ca、無水ケイ酸、乳糖、セルロース、ヒプロメロース、マクロゴール、酸化チタン、セラック、カルナウバロウ、三二酸化鉄

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限をすぎた製品は服用しないで下さい。
- (5) 水分が錠剤に付着しますと、表面の一部が溶けて斑点を生じることがありますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手でふれないで下さい。
- (6) ビンの中の詰め物は、輸送中の錠剤の破損を防止するために入れてありますので、開封後は取り除いて下さい。これをビンに出し入れますと、異物混入の原因になることがあります。



お問い合わせ先

小林薬品工業株式会社 お客様相談室 電話 058(278)3933
受付時間 10時から16時まで (土、日、祝日を除く)

製造販売元

本社所在地

小林薬品工業株式会社

岐阜県岐阜市中鶉1丁目139番地
東京都中央区日本橋箱崎町40番6号