

この説明文書は服用前に必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

## 胃 腸 薬

### 食べすぎ・胃のもたれ・食欲不振・整 腸

# イスナ錠A

胃腸は、食べ物を消化吸収し栄養分を体内へ供給する大切な臓器です。この機能が衰えると、消化不良、食欲不振、もたれなど不快な症状を生じることがあります。

イスナ錠Aは、弱った胃の機能の衰えを助け、改善する消化酵素剤・健胃生薬・整腸剤などを配合した胃腸薬で、消化促進、消化不良、食欲不振、もたれや整腸（便通を整える）に効果を発揮します。

### ⚠ 使用上の注意



#### 相談すること

#### 1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 次の診断を受けた人。

腎臓病



#### 2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位 | 症 状       |
|------|-----------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ |

- (2) 2週間位服用しても症状がよくなる場合

#### 3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること

便秘、下痢

## 効 能

消化促進、消化不良、食欲不振（食欲減退）、胃部・腹部膨満感、胃弱、食べ過ぎ（過食）、飲みすぎ（過飲）、胸やけ、もたれ（胃もたれ）、胸つかえ、はきけ（むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心）、嘔吐、整腸（便通を整える）、軟便、便秘

## 用法・用量

次の量を、水又はぬるま湯で服用して下さい。

| 年 齢        | 1 回量       | 1 日服用回数                     |
|------------|------------|-----------------------------|
| 成人 (15才以上) | 3 錠        | 1 日 3 回、食前又は食後に<br>服用して下さい。 |
| 8 才～14 才   | 2 錠        |                             |
| 5 才～7 才    | 1 錠        |                             |
| 5 才未満      | 服用しないで下さい。 |                             |

### (用法・用量に関連する注意)

- (1)用法・用量を厳守して下さい。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

## 成分・分量 9 錠中

| 成 分 名   | 分 量         | 作 用                                               |
|---------|-------------|---------------------------------------------------|
| 消化酵素剤   | ビオチン 2000   | 炭水化物、脂肪、たんぱく質の消化吸収を助け、胃腸の負担をすみやかに軽減します。           |
|         | 膵臓性消化酵素 T A |                                                   |
|         | リパーゼ A P 6  |                                                   |
|         | プロザイム 6     |                                                   |
| 整 腸 剤   | 有胞子性乳酸菌     | 乳酸菌が腸で繁殖して、腐敗菌などの有害な細菌の増殖をおさえ腸の働きを整えます。           |
| 粘膜修復剤   | カンゾウ末       | 荒れた胃壁を保護・修復します。                                   |
| 健 胃 生 薬 | ガジュツ末       | 芳香性・辛味性・苦味性の健胃生薬の働きにより、消化液の分泌を促進し、弱った胃の働きを活発にします。 |
|         | ケイヒ末        |                                                   |
|         | ゲンチアナ末      |                                                   |
|         | ショウキョウ末     |                                                   |
| 制 酸 剤   | 炭酸マグネシウム    | 過剰の胃酸を中和するとともに、消化酵素の働きやすい状態をつくります。                |
|         | 沈降炭酸カルシウム   |                                                   |

添加物：ヒドロキシプロピルセルロース、メチルセルロース、ステアリン酸Mg、ケイ酸Ca、セルロース、デキストリン、乳糖

本剤の成分には生薬が含まれていますので、製品により錠剤の色調が多少異なることがあります。効果には変わりありません。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。  
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 配置期限をすぎた製品は服用しないで下さい。



## お問い合わせ先

小林薬品工業株式会社 お客様相談室 電話 058(278)3933

受付時間 10時から16時まで (土、日、祝日を除く)

発売元



北海道厚生農業協同組合連合会  
札幌市中央区北4条西1丁目1番地

製造販売元

本 社

小 林 薬 品 工 業 株 式 有 限 公 司

岐阜県岐阜市中鶴1丁目139番地  
東京都中央区日本橋箱崎町40番6号