

【使用上の注意】 相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
皮膚：発疹／消化器：胃部不快感
2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 下痢
3. しばらく服用しても症状がよくなりない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効 能】

○滋養強壮 ○虚弱体質 ○肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

【用法・用量】

成人(15才以上)1日1回1瓶(100mL)を服用してください。

○用法・用量を厳守してください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 配置期限をすぎた製品は服用しないでください。

副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931

ガラス：瓶、金属：キャップ

100mL
タウリン3000mg配合
イノシトール配合
滋養強壮・肉体疲労時の栄養補給に

ビタケンエース
D3000

BITAKEN ACE

第3類医薬品

【成分・分量】 100mL中
タウリン3000mg、アスパラギン酸カリウム・マグネシウム等量混合物200mg、イノシトール100mg、ジクロロ酢酸ジイソプロピルアミン20mg、チアミン硝化物10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム5mg、ピリドキシン塩酸塩30mg、ニコチン酸アミド20mg、カルニチン塩化物100mg、無水カフェイン50mg
(アルコール0.2mL以下)
添加物：カラメル、アルコール、白糖、D-ソルビトール、クエン酸水和物、安息香酸Na、パラベン、香料、バニリン、プロピレングリコール、トコフェロール
○本剤に配合されているリボフラビンリン酸エステルナトリウムにより、尿が黄色くなることがあります。

262円(税込)

製造販売元 小林薬品工業株式会社
岐阜県岐阜市中丸1丁目139番地
本社所在地 東京都中央区日本橋箱崎町40番6号
お客様相談室 電話 058-278-3933

配置
期限
製造
番号



厚生連専用バーコード



発売元 厚生農業協同組合連合会