

〔使用上の注意〕 相談すること

- 1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
皮膚：発疹 / 消化器：胃部不快感
- 2.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 下痢
- 3.しばらく服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

〔用法・用量〕

成人（15才以上）1日1回1瓶（100mL）を服用してください。

○用法・用量を厳守してください。

〔効 能〕

○滋養強壮 ○虚弱体質 ○肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

〔保管及び取扱い上の注意〕

（1）直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。（2）小児の手の届かない所に保管してください。（3）使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

230円＋税

小林薬品工業株式会社 お客様相談室
電話：0120-584-419（10時～16時）

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

滋養強壮・肉体疲労時の栄養補給に 100mL

タウリン2000mgVB₁・2・6配合

**VITAYUNII
EX**

ビタユニー EX

第3類医薬品

製造販売元 **小林薬品工業株式会社**
岐阜県岐阜市中鶴1丁目139番地

〔成分・分量〕 100mL中

タウリン2000mg、L-アスパラギン酸ナトリウム125mg、カルニチン塩化物100mg、チアミン硝化物（ビタミンB₁）10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム（ビタミンB₂）5mg、ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB₆）30mg、ニコチン酸アミド20mg、無水カフェイン50mg

添加物：カラメル、アルコール、白糖、D-ソルビトール、クエン酸水和物、安息香酸Na、パラベン、香料、バニリン、エチルバニリン、プロピレングリコール、トコフェロール（アルコール0.2mL以下） ○本剤に配合されているリボフラビンリン酸エステルナトリウムにより、尿が黄色くなることがあります。

ガラス：瓶
金属：キャップ

使用
期限

製造
番号

