

この説明文書は服用前に必ずお読み下さい。また、
必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

たまった疲れに1日1回で効く ビタミンB₁主薬製剤

ユニベストA錠

第3類医薬品

ユニベストA錠は、ビタミンB₁誘導体フルスルチアミンを配合したビタミンB₁主薬製剤です。ビタミンB₂、活性型ビタミンB₆、ビタミンB₁₂に血行促進成分であるニコチン酸と、補酵素となってエネルギーの産生に重要な働きをするパントテン酸カルシウムを配合し、フルスルチアミンと共に三大栄養素（脂質、タンパク質、糖質）を効率よくエネルギーに変える助けをします。淡黄褐色のフィルムコーティング錠です。

⚠ 使用上の注意



■ 相談すること

1. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、口内炎、食欲不振、腹部膨満感
精神神経系	頭痛
そ の 他	動悸

(2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

2. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること

軟便、下痢、顔面・皮ふの紅潮

効 能

1. 次の場合のビタミンB₁の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時
2. 次の諸症状の緩和：神経痛、筋肉痛・関節痛（腰痛、肩こり、五十肩など）、手足のしびれ、便秘、眼精疲労
3. 脚気
「ただし、上記2および3の症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談して下さい。」

用法・用量

次の量を、食後すぐに水またはぬるま湯でかまずに服用して下さい。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人（15才以上）	2～3錠	1 回
11才～14才	1～2錠	
7才～10才	1錠	
7才未満	服用しないで下さい。	

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守して下さい。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

成分・分量 3錠中

成分名	分量	作用
フルスルチアミン塩酸塩 (ビタミンB ₁ 誘導体)	109.16mg	吸収のよいビタミンB ₁ で、神経痛、手足のしびれ、眼精疲労などの症状を改善します。
リン酸ピリドキサル (活性型ビタミンB ₆)	20mg	体内で利用されやすいビタミンB ₆ で、神経の機能を正常に保ちます。
シアノコバラミン (ビタミンB ₁₂)	60μg	末梢神経の機能を正常に保つ作用があります。
リボフラビン (ビタミンB ₂)	12mg	エネルギー供給や目の健康に必要なビタミンです。
ニコチン酸	30mg	末梢部の血行をよくし、肩こり、手足のしびれの緩和に効果があります。
パントテン酸カルシウム	15mg	エネルギー産生に必要なビタミンです。

添加物：乳酸Ca、CMC-Ca、ヒドロキシプロピルセルロース、メチルセルロース、ステアリン酸Mg、無水ケイ酸、乳糖、セルロース、ヒプロメロース、マクロゴール、酸化チタン、カルナウバロウ、三二酸化鉄

<成分・分量に関連する注意>

本剤の服用により尿が黄色になることがありますが、リボフラビン（ビタミンB₂）によるもので心配ありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限をすぎた製品は服用しないで下さい。
- (5) 水分が錠剤に付着しますと、表面の一部が溶けて斑点を生じることがありますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手でふれないで下さい。
- (6) ビンの中の詰め物は、輸送中の錠剤の破損を防止するために入れてありますので、開封後は取り除いて下さい。これをビンに出し入れしますと異物混入の原因になることがあります。



製品のお問い合わせ先

小林薬品工業株式会社 お客様相談室
電話 058(278)3933
受付時間 10時から16時まで(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の お問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
☎0120-149-931(フリーダイヤル)

製造販売元

本社所在地

小林薬品工業株式会社

岐阜県岐阜市中鶉1丁目139番地
東京都中央区日本橋箱崎町40番6号