

この説明文書は服用前に必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

鎮咳去痰薬 **ハリーV** せき止め液 第②類医薬品

ハリーVせき止め液は、不快な症状であるたんを出しやすくするブロムヘキシン塩酸塩をはじめ、せきをやわらげるジヒドロコデインリン酸塩などの成分を配合した白糖を使用していないシュガーレスシロップ剤です。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)
1. 次の人には服用しないこと
(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2) 12才未満の小児。
 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないこと
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと
(眠気等があらわれることがある。)
 4. 授乳中の人には本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること
 5. 過量服用・長期連用しないこと



■ 相談すること

1. 次の人には服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 高齢者。
(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5) 次の症状のある人。 高熱、排尿困難
(6) 次の診断を受けた人。 心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌 尿 器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症 状 の 名 称	症 状
シ ョ ッ ク (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
呼 吸 抑 制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 便秘、□のかわき、眠気
4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

用法・用量

年 齢	1 回 量	服 用 回 数
成人(15才以上)	10mL	1日3回食後および必要な場合には就寝前に服用してください。また、約4時間の間隔を置いていただければ1日6回まで服用できます。(添付の目盛付コップではかり服用してください。)
12 才 ～ 14 才	6mL	
12 才 未 満	服用しないでください。	

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)本剤は生薬エキスを含有していますので、まれに沈殿を生じることがありますが効果には影響ありません。よく振ってから服用してください。

効 能
せき、たん

成分・分量 60mL中

成 分 名	分 量	作 用
ブロムヘキシン塩酸塩	12mg	気管支粘膜での分泌物を増加させ異物の排出をスムーズにします。さらに分泌腺から分泌される粘性の高いたんを溶解して排出しやすくします。
ジヒドロコデインリン酸塩	30mg	咳中枢を抑制して、鎮咳作用を発揮します。
dｻｰﾒﾁﾙｴﾌｴﾄﾞﾘﾝ塩酸塩	75mg	気管支をひろげて、せきを和らげ、たんを出しやすくします。
dｰｸﾛﾙﾌｴﾆﾗﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩	6mg	抗ヒスタミン剤。アレルギー性のせきに効果があります。
無水カフェイン	60mg	眠気を防ぎます。
キキョウ流エキス	0.6mL (キキョウ600mgに相当)	気道の分泌物を増加させるとともに、纖毛運動を活発にしていたんの排出を助けます。
セネガ流エキス	0.6mL (セネガ600mgに相当)	

添加物：D-ソルビトール、アルコール、クエン酸水和物、安息香酸Na、パラベン、香料、グリセリン

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)服用後は、ビンのフタをよくしめてください。しめ方が悪いと内容液がもれたり、汚染したりすることがありますので注意してください。
- (5)添付の目盛付コップはご使用のつど、水洗いなどして常に清潔に保管してください。
- (6)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。



製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

小林薬品工業株式会社 お客様相談室

電 話：0 1 2 0 - 5 8 4 - 4 1 9

受付時間：10時～16時(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構

☎0120-149-931(フリーダイヤル)