

販売名:小児用ヒストミンゴールド液S

【成分・分量】30mL中
カンゾウエキス150mg、タウリン100mg、グルコン酸カルシウム水和物100mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム1mg、パンテノール3.3mg
添加物:アルコール、白糖、クエン酸Na水和物、クエン酸水和物、安息香酸Na、パラベン、香料、グリセリン、バニリン、ミツロウ、パーメントール、エチルバニリン

【用法・用量】5才～14才 1回1瓶(30mL)を1日3回服用してください。
(1)用法・用量を厳守してください。(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。



ガラス:瓶、金属:キャップ

HapYcom

栄養ドリンク

ジュニア



熱によるだるさ、
胃腸障害、虚弱体質

30mL 第2類医薬品

【効 能】

○幼小児の発育期・偏食児・発熱性消耗性疾患・病中病後・胃腸障害・栄養障害などの場合の栄養補給○虚弱体質○滋養強壮

製 造 小林薬品工業株式会社

販売元 岐阜県岐阜市中鷗1丁目139番地

お客様相談室 電話:058-278-3933

副作用被害救済制度 ☎ 0120(149)931

【使用上の注意】○本剤は小児用ですが、定められた一般的な注意事項を記載しています。

してはいけないこと(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)長期連用しないこと

相談すること1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること(1)医師の治療を受けている人。(2)高齢者。(3)むくみのある人。(4)高血圧、心臓病、腎臓病の診断を受けた人。2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 皮膚:発疹/消化器:胃部不快感まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。偽アルドステロン症、ミオパチー:手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 下痢 4.5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【保管及び取扱い上の注意】(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)

使用
期限

製造
番号