

この説明文書は服用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

総合感冒薬 **ブルミンゴールドV微粒** 第②類医薬品

ブルミンゴールドV微粒は、8種類の有効成分を配合した携帯に便利な分包タイプの総合感冒薬です。
● せきをしずめるジヒドロコデインリン酸塩に加え、*dl*-メチルエフェドリン塩酸塩やグアイフェネシンが、せきやせきの一因となるたんに効果を発揮します。
● アセトアミノフェンが発熱、頭痛、のどの痛みを緩和します。
● クロルフェニラミンマレイン酸塩が鼻水、鼻づまりをおさえます。

 使用上の注意

 してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと

- (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- (3)12才未満の小児。
- (4)フェニルケトン尿症の人。(本剤はL-フェニルアラニン化合物を含んでいます。)

必ずお読みください。



2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないこと

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと

(眠気等があらわれることがある。)

4. 授乳中の人には本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること

5. 服用前後は飲酒しないこと

6. 長期連用しないこと

 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3)高齢者。
- (4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5)次の症状のある人。
高熱、排尿困難
- (6)次の診断を受けた人。
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症



2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌 尿 器	排尿困難
そ の 他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症 状 の 名 称	症 状
シ ョ ッ ク (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎 障 害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。

再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
便秘、口のかわき、眠気

4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効 能

かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

用法・用量

次の量を、食後なるべく30分以内に水又はぬるま湯で服用してください。

年 齢	1 回 量	服用回数
成人(15才以上)	1 包	1 日 3 回
12才～14才	2 / 3 包	
12才未満	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>
(1)用法・用量を厳守してください。
(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量 0.9g×3包中

成 分 名	分 量	作 用
アセトアミノフェン	900mg	熱をさげ、頭痛や関節・筋肉の痛みを緩和します。
グアイフェネシン	180mg	たんを切れやすくします。
クロルフェニラミン マレイン酸塩	7.5mg	鼻水、くしゃみ、鼻づまりなどのアレルギー症状をおさえます。
ジヒドロコデインリン酸塩	24mg	せき中枢に作用して、せきをしづめます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg	気管支に作用して、たんの排出を容易にし、気管支を広げ呼吸を楽にします。
無水カフェイン	75mg	頭痛をやわらげます。
チアミン硝化物	25mg	かぜの時に消耗の激しいビタミンB1・B2を補います。
リボフラビン	12mg	

添加物：乳糖水和物、トウモロコシデンプン、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、二酸化ケイ素、ポリビニルアルコール・アクリル酸・メタクリル酸メチル共重合体、メタケイ酸アルミン酸Mg、ステアリン酸Mg、香料

<成分・分量に関連する注意>
リボフラビン(ビタミンB2)により、尿が黄色になることがあります。

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
(2)小児の手の届かない所に保管してください。
(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
(4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
(5)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。
小林薬品工業株式会社 お客様相談室
電話：0120-584-419
受付時間：10時～16時(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の
お問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
☎ 0120-149-931(フリーダイヤル)

製造販売元 **小林薬品工業株式会社**
岐阜県岐阜市中鷗1丁目139番地