

服用に際しては、この添付文書をよくお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。

乳酸菌、納豆菌、消化酵素

整腸・消化薬

ザ7"ロツ7EX錠

第3類医薬品

〔特 徴〕

- 乳酸菌(Streptococcus Faecalis BIO株)と納豆菌(Bacillus Subtilis BN株)が、腸内の悪玉菌の増殖を抑制し、大腸を正常な働きに整えます。
- ビオヂアスターゼ(複合消化酵素)は、でんぷん、たんぱく質の消化を助け、センブリ、ケイヒ、ウイキョウの健胃成分が、弱った胃の働きを高めることで消化を良くし、大腸への負担をやわらげます。
- MMSC(メチルメチオニンスルホニウムクロライド)は、荒れた胃の粘膜を修復します。
- ジメチルポリシロキサンが、腸管内にたまったガスの排出を促進します。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3) 甲状腺機能障害の診断を受けた人。(4) 抗凝血剤「ワルファリン」を服用している人。
 2. 服用後、以下の症状があらわれた場合は、副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- | 関係部位 | 症 状 |
|------|-----------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
下痢、便秘
 4. 2週間位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

● 効 能

整腸(便通を整える)、軟便、便秘、胃部・腹部膨満感、消化不良、消化促進、もたれ、胃弱、食欲不振、食べ過ぎ、飲み過ぎ、はきけ、嘔吐、胸やけ、胸つかえ

● 用法・用量

成人(15才以上) 1回3錠 11才以上15才未満 1回2錠
11才未満は服用しないでください。 1日3回食後に服用してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- ・用法・用量を厳守してください。
- ・小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

● 成分・分量 9錠中

ラクトミン(乳酸菌)(ストレプトコッカスファエカリスBIO株)	100mg
糖化菌(納豆菌)(バチルススプチリスBN株)	120mg
ビオヂアスターゼ	60mg
センブリ末	30mg
ジメチルポリシロキサン	120mg
ケイヒ末	30mg
メチルメチオニンスルホニウムクロライド(MMSC)	30mg
ウイキョウ末	30mg
沈降炭酸カルシウム	300mg
炭酸マグネシウム	300mg

添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、パレイショデンプン、 α -メントール、セルロース、無水ケイ酸、ステアリン酸Mgを含有します。

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 本品は生菌・酵素剤のため、中身が変質しないよう必ず密栓してください。(4) 服用に際し、水分を落としたり、ぬれた手で触れないようにし、万一ぬれた場合は、その錠剤を捨ててください。(5) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。(6) 本品は生薬を含むため、錠剤の色が一定でない場合や、わずかに斑点や繊維質を認める場合がありますが、品質には影響がないので、安心して服用してください。(7) 外箱に表示した使用期限内に服用してください。また、品質保持の点から、開封後は6ヵ月以内を目安に服用してください。

米田薬品工業株式会社

製造販売元 奈良県高市郡高取町市尾986

03403013



本品について
のお問合せ先

お客様相談室 電話:0120-18-3548
月～金曜日(祝日を除く) 10:00～16:00

副作用被害救済制度 電話:0120-149-931 2409M