

ご使用に際し、この添付文書は必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

## 第②類医薬品 鎮痛薬 ツートン



### 使用上の注意

#### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

##### 1. 次の人は服用しないこと

(1) 今までに本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。

(2) 今までに本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

##### 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと

他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬

##### 3. 服用時は飲酒しないこと

##### 4. 長期連用しないこと

#### 相談すること

##### 1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

(3) 水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児(15歳未満)。

(4) 高齢者。

(5) 本人又は家族がアレルギー体質の人。

(6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(7) 次の診断を受けた人。

心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍

##### 2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談すること

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位 | 症 状        | 関係部位  | 症 状 |
|------|------------|-------|-----|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ  | 精神神経系 | めまい |
| 消化器  | 悪心・嘔吐、食欲不振 |       |     |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。  
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

| 症状の名称                                                   | 症 状                                                         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ショック<br>(アナフィラキシー)                                      | 服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。 |
| 皮膚粘膜眼症候群<br>(スティーブンス・ジョンソン症候群)<br>中毒性表皮壊死症<br>(ライエル症候群) | 高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜に表れる。             |
| 肝機能障害                                                   | 全身のだるさ、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)等があらわれる。                              |
| ぜんそく                                                    |                                                             |

(2) 5～6回服用しても症状がよくなりえない場合

## 【効能・効果】

- (1)頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛  
(2)悪寒・発熱時の解熱

## 【用法・用量】

次の1回量を1日2回を限度とし、なるべく空腹時をさけ、水又はお湯で服用すること。服用間隔は6時間以上おくこと。

| 年 齢 区 分    | 服用量(1回量) | 年 齢 区 分  | 服用量(1回量) |
|------------|----------|----------|----------|
| 15歳以上      | 1包       | 3歳以上7歳未満 | 1/3包     |
| 11歳以上15歳未満 | 2/3包     | 1歳以上3歳未満 | 1/4包     |
| 7歳以上11歳未満  | 1/2包     | 1歳未満     | 服用しないこと  |

## (用法・用量に関連する注意)

1. 定められた用法、用量を厳守すること。
2. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

## 【成分・分量】

1日量 2包(2,000mg)中

| 成 分       | 分 量   | は たら き                         |
|-----------|-------|--------------------------------|
| アセトアミノフェン | 600mg | 炎症を抑え、頭痛、歯痛、関節の痛みをやわらげ、熱を下げます。 |
| エテンザミド    | 800mg | 痛みをしずめ、熱を下げます。                 |
| 無水カフェイン   | 100mg | 痛みをおさえる成分の働きを助けます。             |

添加物：乳糖水和物、カルメロースナトリウム

## 【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない、涼しい所に保管すること。
2. 小児の手の届かない所に保管すること。
3. 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないこと。
4. 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。
5. 使用期限(外袋記載)を過ぎた製品は服用しないこと。

## お問い合わせ先

製造販売元 西海製薬株式会社

住 所 佐賀県三養基郡基山町大字宮浦192番地  
電話番号 0942-92-2303(代)  
受付時間 9:00~16:00(土、日、祝日を除く)