

ご使用に際し、この添付文書は必ずお読みください。
また、必要な時にお読みになれるように大切に保管してください。

第②類医薬品

鎮咳去痰薬

セキドメ



使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと
(他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬
(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬))
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと
(眠気があらわれることがある。)

相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 授乳中の人。
- (4) 高齢者。
- (5) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (7) 次の症状のある人。 高熱、排尿困難
- (8) 次の診断を受けた人。

心臓病、緑内障、甲状腺機能障害、糖尿病、高血圧

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ	精神神経系	めまい
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振	その他	排尿困難

(2) 5～6回服用しても症状がよくならない場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること

口のかわき

【効能・効果】

せき、たん

【用法・用量】

年 齢 区 分	服用量（1回量）
15歳以上	1包
11歳以上15歳未満	2／3包
8歳以上11歳未満	1／2包
5歳以上8歳未満	1／3包
3歳以上5歳未満	1／4包
3 歳 未 満	服用しないこと

1. いずれも1日3回、食後なるべく30分以内に服用すること。
2. 水またはお湯と一緒に服用すること。

（用法・用量に関連する注意）

1. 定められた用法、用量を厳守すること。
2. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
3. 3才未満の幼・乳児には服用させないこと。

【成分・分量】

1日量 3包(3,000mg)中に次の成分を含んでいます。

成 分 名	含 有 量	成 分 名	含 有 量
チペピジンヒベンズ酸塩	75mg	クロルフェニラミン マレイン酸塩	10mg
dl-メチルエフェドリン 塩酸塩	75mg	無水カフェイン	100mg
ノスカピン	60mg		

添加物として乳糖、カルメロースナトリウム、カルメロースカルシウムを含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

- 1. 直射日光の当たらない湿気の少ない、涼しい所に保管すること。
- 2. 小児の手の届かない所に保管すること。
- 3. 誤用をさげ、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないこと。
- 4. 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。
- 5. 使用期限（外箱記載）を過ぎた製品は服用しないこと。

お問い合わせ先

製造販売元 西海製薬株式会社

住 所 佐賀県三養基郡基山町大字宮浦192番地

電話番号 0942-92-2303(代)

受付時間 9:00～16:00(土、日、祝日を除く)