

グレニアチン®

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 胃腸が弱く下痢しやすい人。
 - 高齢者。
 - 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、腹痛
 - 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合
- 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること
下痢
- 他の医薬品等を併用する場合には、含有成分の重複に注意する必要があるので、医師又は薬剤師に相談すること

効能・効果

リウマチ、神経痛

用法・用量

次の量を食後に、コップ半分以上のぬるま湯にて服用して下さい。

年 齢	1回量		1日服用回数
	容器入りの場合	分包品の場合	
大人(15歳以上)	1.5g(添付のサジ1杯)	1包	3回
15歳未満	服用しないこと		

〈用法・用量に関連する注意〉

用法・用量を厳守すること。

成分・分量

本剤4.5g又は3包中

カンゾウ0.05g・ゴシツ0.5g・ジオウ0.7g シャクヤク0.8g・ショウキョウ0.05g・センキュウ0.7g チンピ0.1g・トウキ0.7g・トウニン0.2g ビャクシ0.2g・ビャクジュツ0.05g・ブクリョウ0.05g ボウイ0.5g・ボウフウ0.5g・リュウタン0.05g イレイセン0.3g・キョウカツ0.5g	}	エキス…0.7g
---	---	----------

カンゾウ末…0.9g、ショウキョウ末…0.1g、ビャクジュツ末…1.3g、
ブクリョウ末…1.4g、リュウタン末…0.05g、チンピ末…0.05g

- ・本剤は淡黄褐色で、特異なおいを有し、味は甘い散剤です。
- ・本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがありますが、効果に変わりはありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 分包品において1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。

グレニアチンは生薬の特性を活かした生薬製剤ですので、あなたの体質や病状を考えて正しく服用することが大切です。

あなたの病気を早く治すため、お薬の服用に際しては、生薬製剤のことをご理解いただいている医師・薬局・薬店の先生方とよくご相談下さい。

お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願いします。

剂盛堂薬品株式会社 学術部

電話 073(472)3111(代表)

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元



剂盛堂薬品株式会社

〒640-8323 和歌山市太田515番地1