

【漢方薬】

フラーリン® Q

◆ フラーリンQは、きんぎょうりやく金匱要略という書物に書かれている処方をもとに弊社が考案したお薬です。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと事故が起こりやすくなる)

次の人は服用しないこと

生後3ヵ月未満の乳児。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 胃腸の弱い人。
- (4) 高齢者。
- (5) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振、胃部不快感

(2) 1ヵ月位(子宮出血に服用する場合には1週間位)服用しても症状がよくならない場合

3. 他の医薬品等を併用する場合には、含有成分の重複に注意する必要があるので、医師又は薬剤師に相談すること

効能・効果

貧血、月経不順、月経痛、子宮出血、妊婦強壮薬、産前産後の強壮薬、腰痛

*用法・用量

次の量を随時^{注)}、コップ半分以上のぬるま湯にて服用して下さい。

注)「随時服用」とは食前・食間(食後2～3時間)・食後のいつ服用してもよいことを指しますが、
胃腸の弱い方は食後の服用がよいでしょう。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1.5g(添付のサジ2杯)	3回
10歳以上15歳未満	成人の2/3の量(1.0 g)	
5歳以上10歳未満	成人の1/2の量(0.75 g)	
5歳未満	成人の1/4の量(0.375g)	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (3) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させること。
- (4) 生後3ヵ月未満の乳児には服用させないこと。

*成分・分量

本剤4.5g中

センキュウ……0.882g	}	エキス…2.206mL（固形物として0.088g）
タクシヤ……1.765g		
トウキ……0.882g		

タイソウエキス……2.403mL （固形物として0.368g）	}	混合物…4.412g
オウギ末……0.061g		
カンゾウ末……0.368g		
ケイヒ末……0.797g		
シャクヤク末……1.225g		
ショウキョウ末……0.306g		
ソウジュツ末……0.613g		
トウキ末……0.061g		
ブクリョウ末……0.613g		

- ・本剤は褐色で、特異なおいを有し、味は初めわずかに甘く後わずかに苦い散剤です。
- ・本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがあります、効果に変わりはありません。

保管及び取扱い上の注意

- （1） 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- （2） 小児の手の届かない所に保管すること。
- （3） 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

フラーリンQは生薬の特性を活かした漢方薬ですので、あなたの体質や病状を考えて正しく服用することが大切です。

あなたの病気を早く治すため、お薬の服用に際しては、漢方薬のことをご理解いただいている医師・薬局・薬店の先生方とよくご相談下さい。

お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記をお願いします。

剤盛堂薬品株式会社 学術部

電話 073(472)3111(代表)

受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元



剤盛堂薬品株式会社

〒640-8323 和歌山市太田515番地1