

【漢方薬】

フラーリン® Q錠

- ◆ フラーリンQ錠は、金匱要略^{きんきようりやく}という書物に書かれている処方をもとに弊社が考案したお薬です。月経不順や月経困難などを改善するように働きます。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 胃腸の弱い人。
 - 高齢者。
 - 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振、胃部不快感
 - 1ヵ月位(痔出血に服用する場合には1週間位)服用しても症状がよくなる場合
- 他の医薬品等を併用する場合には、含有成分の重複に注意する必要があるため、医師又は薬剤師に相談すること

効能・効果

月経不順、月経困難、月経痛、腰痛、痔出血、脱肛^{a)}、妊娠中の浮腫^{b)}、痔疾、ヒステリー、更年期神経症^{c)}

a)脱肛：で痔のことを示します。

b)浮腫：むくみのことを示します。

c)更年期神経症：更年期に起こる神経症のことを示します。

用法・用量

次の量を随時^注、コップ半分以上のぬるま湯にて服用して下さい。

注)「随時服用」とは食前・食間(食後2～3時間)・食後のいつ服用してもよいことを指しますが、胃腸の弱い方は食後の服用がよいでしょう。

年 齢	1回量	1日服用回数
大 人	5錠	3回
15歳未満	服用しないこと	

＜用法・用量に関連する注意＞

用法・用量を厳守すること。

成分・分量

本剤40錠(8g)中

オウギ・カンゾウ・ケイヒ	乾燥エキス ……2g	カンゾウ末……1.0g
シャクヤク・ショウキョウ・センキュウ		ケイヒ末……1.0g
タイソウ・タクシャ・トウキ		センキュウ末……0.6g
ビャクジュツ・ブクリョウ		ビャクジュツ末……1.4g
		ブクリョウ末……2.0g

・本剤は淡黄褐色で、味はわずかに苦い素錠です。

・本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがありますが、効果に変わりはありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 分包品において1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。

フラールンQ錠は生薬の特性を活かした漢方薬ですので、あなたの体質や病状を考えて正しく服用することが大切です。

あなたの病気を早く治すため、お薬の服用に際しては、漢方薬のことをご理解いただいている医師・薬局・薬店の先生方とよくご相談下さい。

お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記をお願いします。

剂盛堂薬品株式会社 学術部

電話 073(472)3111(代表)

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元



剂盛堂薬品株式会社

〒640-8323 和歌山市太田515番地1