

【生薬製剤】

フラーリン® Q錠

第2類医薬品

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 胃腸の弱い人。
 - 高齢者。
 - 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振、胃部不快感
 - 1ヵ月位(痔出血に服用する場合には1週間位)服用しても症状がよくなる場合
- 他の医薬品等を併用する場合には、含有成分の重複に注意する必要があるので、医師又は薬剤師に相談すること

効能・効果

月経不順、月経困難、月経痛、腰痛、痔出血、脱肛^{a)}、妊娠中の浮腫^{b)}、痔疾、ヒステリー、更年期神経症^{c)}

a)脱肛：で痔のことを示します。

b)浮腫：むくみのことを示します。

c)更年期神経症：更年期に起こる神経症のことを示します。

*用法・用量

次の量を随時^{注)}、コップ半分以上のぬるま湯にて服用して下さい。

注)「随時服用」とは食前・食間(食後2～3時間)・食後のいつ服用してもよいことを指しますが、
胃腸の弱い方は食後の服用がよいでしょう。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	5錠	3回
15歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

用法・用量を厳守すること。

*成分・分量

本剤15錠(3.3g)中	
オウゴン末0.563g・カンゾウ末0.563g	} エキス…2.68mL(固形物として0.75g)
ケイヒ末0.188g・シャクヤク0.75g	
シヨウキョウ末0.188g・センキュウ末0.563g	
タイソウ末0.563g・タクシヤ0.75g	
トウキ0.75g・ビャクジュツ末0.563g	
ブクリョウ末0.563g	
カンゾウ末…0.375g	
ケイヒ末…0.375g	
センキュウ末…0.225g	
ビャクジュツ末…0.525g	
ブクリョウ末…0.75g	

添加物として軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、乳糖を含有する。

- ・本剤は淡黄褐色で、特異なおいを有し、味はわずかに苦い素錠です。
- ・本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがありますが、効果に変わりはありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 分包品において1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。

フラーリンQ錠は生薬の特性を活かした生薬製剤ですので、あなたの体質や病状を考えて正しく服用することが大切です。

あなたの病気を早く治すため、お薬の服用に際しては、生薬製剤のことをご理解いただいている医師・薬局・薬店の先生方とよくご相談下さい。

お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記をお願いします。

剂盛堂薬品株式会社 学術部
電話 073(472)3111(代表)
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元



剂盛堂薬品株式会社

〒640-8323 和歌山市太田515番地1