

この添付文書は、お薬とともに保管し、
服用の際には、必ずお読み下さい。

【漢方薬】

フラーリン[®] A錠

第2類医薬品

- ◆ フラーリンA錠は、万病回春^{まんびょうかいしゅん}という書物に書かれている処方をもとにした漢方薬の錠剤です。水瀉性の下痢・嘔吐・口渴・尿量減少を伴う、食あたり・冷え腹・腹痛などの症状を改善します。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 高齢者。
 - 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
 - 1ヵ月位(急性胃腸炎に服用する場合には5~6回、食あたり、暑気あたりに服用する場合には5~6日間)服用しても症状がよくならない場合
- 他の医薬品等を併用する場合には、含有成分の重複に注意する必要があるため、医師又は薬剤師に相談すること

効能・効果

水瀉性の下痢^{a)}、嘔吐があり、口渴^{b)}、尿量減少を伴う次の諸症：
食あたり、暑気あたり、冷え腹、急性胃腸炎、腹痛

^{a)}水瀉性の下痢：水のような下痢のことで、水様性下痢ともいいます。

^{b)}口渴：口のかわきのことを示します。

用法・用量

次の量を食間^{注)}に、コップ半分以上のぬるま湯にて服用して下さい。

^{注)}「食間」とは食後2~3時間を指します。

年 齢	1回量	1日服用回数
大 人	6錠	3回
15歳未満7歳以上	4錠	
7歳未満5歳以上	3錠	
5歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- 用法・用量を厳守すること。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分・分量

本剤18錠(3.6g)中

カンゾウ末……0.30g	タクシャ末……0.75g	} 胃苓湯水製エキス……0.608g
ケイヒ末……0.60g	チョレイ末……0.75g	
コウボク末……0.75g	チンピ末……0.75g	
ショウキョウ末……0.45g	ビャクジュツ末……0.75g	
ソウジュツ末……0.75g	ブクリョウ末……0.75g	
タイソウ末……0.45g		

カンゾウ末……0.051g	ビャクジュツ末……0.128g
ケイヒ末……0.102g	ブクリョウ末……0.128g
コウボク末……0.128g	タイソウ末……0.077g
ショウキョウ末……0.077g	チョレイ末……0.128g
ソウジュツ末……0.128g	チンピ末……0.128g
タクシャ末……0.128g	

添加物として乳糖を含有する。

- ・本剤は黄褐色で、特異なおいを有し、味は甘く後わずかに苦い素錠です。
- ・本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがありますが、効果に変わりはありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 分包品において1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。

フラーリンA錠は生薬の特性を活かした漢方薬ですので、あなたの体質や病状を考慮して正しく服用することが大切です。

あなたの病気を早く治すため、お薬の服用に際しては、漢方薬のことをご理解いただいている医師・薬局・薬店の先生方とよくご相談下さい。

お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願いします。

剂盛堂薬品株式会社 学術部

電話 073(472)3111(代表)

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元



剂盛堂薬品株式会社

〒640-8323 和歌山市太田515番地1