

【漢方薬】

フラーリン[®] A 錠

第2類医薬品

- ◆ フラーリンA錠は、万病回春^{まんびょうかいしゅん}という書物に書かれている処方を基本にした漢方薬の錠剤です。体力中等度で、水様性の下痢・嘔吐・口渴・尿量減少を伴う方の、食あたり・冷え腹・腹痛などの症状を改善します。

* ! 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 高齢者。
 - (4) 今までに薬などにより発疹・発赤・かゆみ等を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
ひ ふ 皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
3. 1ヵ月位(急性胃腸炎に服用する場合には5~6回、食あたり、暑気あたりに服用する場合には5~6日間)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
4. 他の医薬品等を併用する場合には、含有成分の重複に注意する必要があるので、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

体力中等度で、水様性の下痢、嘔吐があり、口渴^{a)}、尿量減少を伴うものの次の諸症：

食あたり、暑気あたり、冷え腹、急性胃腸炎、腹痛

a)口渴：口のかわきのことを示します。

用法・用量

次の量を食間^{注)}に、コップ半分以上のぬるま湯にて服用して下さい。

注)「食間」とは食後2~3時間を持ちます。

年 齢	1回量	1日服用回数
大 人	6錠	3回
15歳未満7歳以上	4錠	
7歳未満5歳以上	3錠	
5歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分・分量

本剤18錠(3.6g)中

カ ン ズ ウ0.30g	タ ク シ ャ0.75g	胃苓湯水製エキス.....0.608g
ケ イ ヒ0.60g	チ ョ レ イ0.75g	
コ ウ ボ ク0.75g	チ ナ ピ0.75g	
ショウキョウ0.45g	ビ ャ ク ジ ュ ツ0.75g	
ソウジュツ0.75g	ブ ク リ ヨ ウ0.75g	
タ イ ソ ウ0.45g			
カ ン ズ ウ 末0.051g	タ ク シ ャ 末0.128g	
ケ イ ヒ 末0.102g	チ ョ レ イ 末0.128g	
コ ウ ボ ク 末0.128g	チ ナ ピ 末0.128g	
ショウキョウ 末0.077g	ビ ャ ク ジ ュ ツ 末0.128g	
ソウジュツ 末0.128g	ブ ク リ ヨ ウ 末0.128g	
タ イ ソ ウ 末0.077g			

添加物として乳糖を含有する。

- ・本剤は黄褐色で、特異なにおいを有し、味は甘く後わずかに苦い素錠です。
- ・本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがあります、効果に変わりはありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 分包品において1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。

フラーインA錠は生薬の特性を活かした漢方薬ですので、あなたの体質や病状を考えて正しく服用することが大切です。

あなたの病気を早く治すため、お薬の服用に際しては、漢方薬のことをご理解いただいている医師、薬局・薬店の先生方とよくご相談下さい。

お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願いします。

剤盛堂薬品株式会社 学術部

電話 073(472)3111(代表)

受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00

(土、日、祝日を除く)

製造販売元

 剤盛堂薬品株式会社

〒640-8323 和歌山市太田二丁目8番31号