

【生薬製剤】

黄 解 清 血 散

第2類医薬品

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
2. 服用後、まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は副作用の可能性がある
ので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師の診療を受けること

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等 がみられ、これらが急にあらわれたり、持続 したりする。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色 くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等 があらわれる。

3. 1ヵ月位(止血に服用する場合には5～6回)服用しても症状がよくならない場合は服用を
中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

止血、脳溢血^{a)}の予防、胃カタル^{b)}、腸カタル^{c)}

- a)脳溢血：脳内出血のことを示します。
b)胃カタル：胃炎のことを示します。
c)腸カタル：腸炎のことを示します。

用法・用量

次の量を食前又は食間^{注)}に、コップ半分以上のぬるま湯にて服用して下さい。

注)「食間」とは食後2～3時間を指します。

年 齢	1回量		1日服用回数
	容器入りの場合	分包品の場合	
大 人	1.5g(添付のサジ1杯)	1包	3回
12歳以上15歳未満	大人の2/3の量(1.0 g)	2/3包	
7歳以上12歳未満	大人の1/2の量(0.75g)	1/2包	
4歳以上 7歳未満	大人の1/3の量(0.5 g)	1/3包	
4歳未満	服用しないこと		

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分・分量

本剤4.5g又は3包中

オウゴン	2.25 g	} エキス4.125mL (固形物として0.75g)	オウゴン末	1.35g
オウバク	1.125g		オウバク末	1.2 g
オウレン	1.5 g		オウレン末	1.2 g
サンシシ	1.5 g			

- ・本剤は黄褐色で、特異なにおいを有し、味は苦い散剤です。
- ・本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがありますが、効果に変わりはありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 分包品において1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。

黄解清血散は生薬の特性を活かした生薬製剤ですので、あなたの体質や病状を考えて正しく服用することが大切です。

あなたの病気を早く治すため、お薬の服用に際しては、生薬製剤のことをご理解いただいている医師、薬局・薬店の先生方とよくご相談下さい。

お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願いします。

剂盛堂薬品株式会社 学術部

電話 073(472)3111(代表)

受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00
(土、日、祝日を除く)

製造販売元



剂盛堂薬品株式会社

〒640-8323 和歌山市太田二丁目8番31号