

【漢方薬】

ツウケイ散

第2類医薬品

◆ ツウケイ散は、^{しょうかんろん}傷寒論という書物に書かれている処方をもとにした漢方薬の散剤です。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと*

生後3ヵ月未満の乳児。*

2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと

他の瀉下薬(下剤)

3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
- (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
- (5) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

(2) 1ヵ月位(便秘に服用する場合には5～6日間)服用しても症状がよくならない場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること

下痢

4. 本剤の服用により、予期しない出血があらわれた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること

* 効能・効果

体力中等度以上で、のぼせて便秘しがちなものの次の諸症：月経不順、月経困難症、月経痛、月経時や産後の精神不安、腰痛、便秘、高血圧の随伴症状^{a)}(頭痛、めまい、肩こり)、痔疾、打撲症

^{a)}高血圧の随伴症状：高血圧に伴って起こる症状のことを示します。

*用法・用量

次の量を食前又は食間^{注)}に、コップ半分以上のぬるま湯にて服用して下さい。

注)「食間」とは食後2～3時間を指します。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1.5g(添付のサジ1杯)	3回
15歳未満7歳以上	成人の2/3の量(1.0 g)	
7歳未満4歳以上	成人の1/2の量(0.75 g)	
4歳未満2歳以上	成人の1/3の量(0.5 g)	
2歳未満	成人の1/4の量(0.375 g)	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (3) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させること。*
- (4) 生後3カ月未満の乳児には服用させないこと。*

成分・分量

本剤4.5g中

カ	ン	ゾ	ウ	……	0.75g	}	桃核承気湯エキス……1.1g
ケ	イ	ヒ	……	2.0	g		
ダ	イ	オ	ウ	……	1.5		
ト	ウ	ニ	ン	……	2.5		
硫酸ナトリウム	……	1.0	g				

添加物としてバレイショデンプンを含有する。

- ・本剤は黄褐色で、特異なにおいを有し、味は甘く後渋い散剤です。
- ・本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調が異なることや、また天然生薬色素により容器・包装等が黄味を帯びることがありますが、効果に変わりはありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

ツウケイ散は生薬の特性を活かした漢方薬ですので、あなたの体質や病状を考えて正しく服用することが大切です。

あなたの病気を早く治すため、お薬の服用に際しては、漢方薬のことをご理解いただいている医師、薬局・薬店の先生方とよくご相談下さい。

お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願いします。

剂盛堂薬品株式会社 学術部

電話 073(472)3111(代表)

受付時間 9：00～17：00(土、日、祝日を除く)

製造販売元



剂盛堂薬品株式会社

〒640-8323 和歌山市太田二丁目8番31号