

この添付文書は、お薬とともに保管し、
服用の際には、必ずお読み下さい。

【生薬製剤】

強 温 血 散[®]

第2類医薬品

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 胃腸の弱い人。
 - 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
 - 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

効能・効果

神経痛、腰痛、頭痛、凍痛^{a)}、腹痛、アトニー型冷え症^{b)}

^{a)}凍痛：凍傷に伴う痛みのことを示します。

^{b)}アトニー型冷え症：体の虚弱な人の冷え症のことを示します。

用法・用量

次の量を食前又は食間^{注)}に、コップ半分以上のぬるま湯にて服用して下さい。

注)「食間」とは食後2～3時間を指します。

年 齢	1回量		1日服用回数
	容器入りの場合	分包品の場合	
大 人	1.5g(添付のサジ1杯)	1包	3回
10歳以上15歳未満	大人の2/3の量(1.0 g)	2/3包	
5歳以上10歳未満	大人の1/2の量(0.75g)	1/2包	
5歳未満	服用しないこと		

〈用法・用量に関連する注意〉

- 用法・用量を厳守すること。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分・分量

本剤4.5g又は3包中

ゴ シ ユ ユ ……0.064g	} エキス ……1.134mL	カ ン ゾ ウ 末 ……0.419g
シャクヤク ……0.321g		ケ イ ヒ 末 ……0.598g
	(固形物として0.013g)	シャクヤク末 ……0.598g
ゴ シ ユ ユ ……1.795g	} エキス ……1.523mL	ショウキョウ末 ……1.078g
サイ シ ン ……1.197g		ト ウ キ 末 ……0.299g
タイ ソ ウ ……2.991g		モ ク ツ ウ 末 ……0.598g
	(固形物として0.897g)	

- 本剤は褐色で、特異なおいを有し、味は初め甘く後苦い散剤です。
- 本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがありますが、効果に変わりはありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 分包品において1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。

強温血散は生薬の特性を活かした生薬製剤ですので、あなたの体質や病状を考えて正しく服用することが大切です。

あなたの病気を早く治すため、お薬の服用に際しては、生薬製剤のことをご理解いただいている医師・薬局・薬店の先生方とよくご相談下さい。

お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記をお願いします。

剂盛堂薬品株式会社 学術部

電話 073(472)3111(代表)

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元



剂盛堂薬品株式会社

〒640-8323 和歌山市太田515番地1