

この添付文書は、お薬とともに保管し、
服用の際には、必ずお読み下さい。

【生薬製剤】

強 回 血[®] 散

第2類医薬品

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 胃腸の弱い人。
 - 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
消化器	食欲不振、胃部不快感
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
 - 1ヵ月位(痔出血に服用する場合には1週間位)服用しても症状がよくなりえない場合

効能・効果

当帰芍薬散適応症者^{a)}の次の諸症：貧血、月経不順、冷え症、脚気、痔核^{b)}、脱肛^{c)}、痔出血、胃アトニー^{d)}、頭痛、帯下^{e)}、妊娠腎^{f)}、月経痛、ヒステリー、腎臓病、更年期障害、子宮後屈

- ^{a)}当帰芍薬散適応症者：比較的体力が乏しく冷え症で貧血の傾向があるような体質の人を示します。
^{b)}痔核：いぼ痔のことを示します。
^{c)}脱肛：で痔のことを示します。
^{d)}胃アトニー：胃の緊張や運動能力が低下した状態を示します。
^{e)}帯下：おりもののことを示します。
^{f)}妊娠腎：妊娠が原因でおこる腎機能の障害のことを示します。

用法・用量

次の量を食前又は食間^{注)}に、コップ半分以上のぬるま湯にて服用して下さい。

注)「食間」とは食後2～3時間を指します。

年 齢	1回量		1日服用回数
	容器入りの場合	分包品の場合	
大 人	1.5g(添付のサジ1.5杯)	1包	3回
10歳以上15歳未満	大人の2/3の量(1.0 g)	2/3包	
5歳以上10歳未満	大人の1/2の量(0.75g)	1/2包	
5歳未満	服用しないこと		

〈用法・用量に関連する注意〉

- 用法・用量を厳守すること。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分・分量

本剤4.5g又は3包中

シャクヤク……0.923g	} エキス……1.708mL (固形物として0.231g)	シャクヤク末……1.553g
センキュウ……0.692g		センキュウ末……0.776g
ト ウ キ……0.692g		ソウジュツ末……0.388g
		タクシャ末……0.776g
		ト ウ キ 末……0.388g
		ブクリョウ末……0.388g

- ・本剤は灰褐色で、特異なにおいを有し、味はわずかに辛い散剤です。
- ・本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがありますが、効果に変わりはありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 分包品において1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。

強回血散は生薬の特性を活かした生薬製剤ですので、あなたの体質や病状を考えて正しく服用することが大切です。

あなたの病気を早く治すため、お薬の服用に際しては、生薬製剤のことをご理解いただいている医師・薬局・薬店の先生方とよくご相談下さい。

お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願いします。

剂盛堂薬品株式会社 学術部

電話 073(472)3111(代表)

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元



剂盛堂薬品株式会社

〒640-8323 和歌山市太田515番地1