

【漢方薬】

# ホノミ ヨウジョウ 粒<sup>®</sup>

◆ ホノミヨウジョウ粒<sup>しょうかんりん きんぎょうりゅうく</sup>は傷寒論や金匱要略という書物に書かれている処方をもとにした漢方薬の顆粒剤です。



## 使用上の注意



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

次の人は服用しないこと

生後3ヵ月未満の乳児。



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。

むくみ

- (6) 次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、腎臓病

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位 | 症 状       |
|------|-----------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

| 症状の名称     | 症 状                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| 偽アルドステロン症 | 尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。 |

- (2) 1ヵ月位(下痢、嘔吐に服用する場合には1週間位)服用しても症状がよくならない場合

3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること

## 効能・効果

手足などが冷えやすく、尿量が多いものの次の諸症：胃腸虚弱、胃アトニー<sup>a)</sup>、下痢、嘔吐、胃痛

<sup>a)</sup>胃アトニー：胃の緊張や運動能力が低下した状態を示します。

\* 用法・用量

次の量を食間<sup>注)</sup>に、コップ半分以上のぬるま湯にて服用して下さい。

<sup>注)</sup>「食間」とは食後2～3時間を指します。

| 年 齢       | 1回量              | 1日服用回数 |
|-----------|------------------|--------|
| 成人(15歳以上) | 1.5g(添付のサジ1杯)    | 3回     |
| 7歳以上15歳未満 | 成人の2/3の量(1.0 g)  |        |
| 4歳以上 7歳未満 | 成人の1/2の量(0.75 g) |        |
| 2歳以上 4歳未満 | 成人の1/3の量(0.5 g)  |        |
| 2歳未満      | 成人の1/4の量(0.375g) |        |

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (3) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させること。
- (4) 生後3ヵ月未満の乳児には服用させないこと。

成分・分量

本剤4.5g中

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| カンキョウ……1.5g  | } 人參湯水製エキス……0.900g |
| カンゾウ……1.5g   |                    |
| ニンジン……1.5g   |                    |
| ビャクジュツ……1.5g |                    |

添加物としてカルメロースカルシウム、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウムを含有する。

- ・本剤は灰褐色で、特異なおいを有し、味は初め辛く後甘い顆粒剤です。
- ・本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがありますが、効果に変わりはありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

ホノミヨウジョウ粒は漢薬の特性を活かした漢方薬ですので、あなたの体質や病状を考えて正しく服用することが大切です。

あなたの病気を早く治すため、お薬の服用に際しては、漢方薬のことをご理解いただいている医師・薬局・薬店の先生方とよくご相談下さい。

お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願いします。

剂盛堂薬品株式会社 学術部

電話 073(472)3111(代表)

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元



剂盛堂薬品株式会社

〒640-8323 和歌山市太田515番地1