

【漢方薬】

ホノミ[®]アンセイ粒

◆ ホノミアンセイ粒^{きんきようりゅう}は金匱要略という書物に書かれている処方をもとにした漢方薬の顆粒剤です。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

次の人は服用しないこと

生後3ヵ月未満の乳児。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

(2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

効能・効果

気分がふさいで、咽喉・食道部に異物感があり、時に動悸^{どうき}、めまい、嘔気^{おうき}などを伴う次の諸症：
不安神経症、神経性胃炎、つわり、せき、しわがれ声

^{a)}嘔気：はきけのことを示します。

*用法・用量

次の量を食間^{注)}に、コップ半分以上のぬるま湯にて服用して下さい。

^{注)}「食間」とは食後2～3時間を指します。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1.5g(添付のサジ1杯)	3回
7歳以上15歳未満	成人の2/3の量(1.0 g)	
4歳以上 7歳未満	成人の1/2の量(0.75 g)	
2歳以上 4歳未満	成人の1/3の量(0.5 g)	
2歳未満	成人の1/4の量(0.375g)	

〈用法・用量に関連する注意〉

(1) 用法・用量を厳守すること。

(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

(3) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させること。

(4) 生後3ヵ月未満の乳児には服用させないこと。

成分・分量

本剤4.5g中

コウボク	1.5g	}	半夏厚朴湯水製エキス	0.77g
ショウキョウ	0.5g			
ソヨウ	1.0g			
ハンゲ	3.0g			
ブクリョウ	2.5g			

添加物としてカルメロースカルシウム、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウムを含有する。

- ・本剤は淡褐色で、特異なおいを有し、味は辛い顆粒剤です。
- ・本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがありますが、効果に変わりはありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

ホノミアンセイ粒は漢薬の特性を活かした漢方薬ですので、あなたの体質や病状を考えて正しく服用することが大切です。
あなたの病気を早く治すため、お薬の服用に際しては、漢方薬のことをご理解いただいている医師・薬局・薬店の先生方とよくご相談下さい。

お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記をお願いします。

剂盛堂薬品株式会社 学術部

電話 073(472)3111(代表)

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元



剂盛堂薬品株式会社

〒640-8323 和歌山市太田515番地1