

この添付文書は、お薬とともに保管し、
服用の際には、必ずお読み下さい。

【漢方薬】

抑肝眩悸散[®]

◆ 抑肝眩悸(ヨッカゲンキ)散は日本において考案された漢方処方を基本にした漢方薬の散剤です。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 胃腸の弱い人。
 - 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ
 - 1ヵ月位(夜なきに服用する場合には1週間位)服用しても症状がよくなる場合

効能・効果

ヒステリー、婦人更年期神経症^{a)}、夜なき、悪阻^{b)}、小児のかん(かんむし)

a)更年期神経症：更年期に起こる神経症のことを示します。

b)悪阻：つわりのことを示します。

用法・用量

次の量を食前又は食間[※]に、コップ半分以上のぬるま湯にて服用して下さい。

※「食間」とは食後2～3時間を指します。

年 齢	1回量		1日服用回数
	容器入りの場合	分包品の場合	
大 人	1.5g(添付のサジ1杯)	1包	3回
7歳以上15歳未満	1.0 g	2/3包	
4歳以上 7歳未満	0.75g	1/2包	
4歳未満	服用しないこと		

〈用法・用量に関連する注意〉

- 用法・用量を厳守すること。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分・分量

本剤4.5g又は3包中

カンゾウ末	0.066g	トウキ	0.662g	} エキス…0.529g
サイコ	0.860g	ハシゲ	1.125g	
センキュウ末	0.662g	ブクリョウ末	0.066g	
ソウジュツ末	0.066g	チョウトウコウ末	0.662g	
チンピ	0.662g			
カンゾウ末	0.926g			
ソウジュツ末	1.324g			
ブクリョウ末	1.721g			

- 本剤は淡黄褐色で、特異なおいを有し、味は甘い散剤です。
- 本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがありますが、効果に変わりはありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 分包品において1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。

抑肝絃悸散は漢薬の特性を活かした漢方薬ですので、あなたの体質や病状を考えて正しく服用することが大切です。

あなたの病気を早く治すため、お薬の服用に際しては、漢方薬のことをご理解いただいている医師・薬局・薬店の先生方とよくご相談下さい。

お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願いします。

剂盛堂薬品株式会社 學術部

電話 073(472)3111(代表)

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元



剂盛堂薬品株式会社

〒640-8323 和歌山市太田515番地1