

【漢方薬】

ワグラス®B錠

- ◆ ワグラスB錠は金匱要略や傷寒論という書物に書かれている処方をもとにして弊社が考案した漢方薬の錠剤です。血行を良くしてうっ血を改善し、湿疹や打撲などの皮膚科・外科疾患を改善します。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
 - 胃腸が弱く下痢しやすい人。
 - 高齢者。
 - 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の医薬品を服用している人。
瀉下薬(下剤)
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛
 - 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合
- 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること
軟便、下痢
- 本剤の服用により、予期しない出血があらわれた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること
- 他の医薬品等を併用する場合には、含有成分の重複に注意する必要があるため、医師又は薬剤師に相談すること

効能・効果

比較的強い体質者で血行障害のあるものの皮膚科・外科疾患(湿疹、にきび、打撲傷、しもやけ、痔核^{a)})の改善又は回復促進

^{a)}痔核：いば痔のことを示します。

用法・用量

次の量を随時^{注)}、コップ半分以上のぬるま湯にて服用して下さい。

注)「随時服用」とは食前・食間(食後2~3時間)・食後のいつ服用してもよいことを指しますが、
胃腸の弱い方は食後の服用がよいでしょう。

年 齢	1回量	1日服用回数
大 人	5錠	3回
15歳未満12歳迄	4～3錠	
12歳未満 7歳迄	3～2錠	
7歳未満 5歳迄	2～1錠	
5歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分・分量

本剤15錠(3g)中

カンゾウ・ケイヒ	乾燥エキス ……0.6g	カンゾウ末……0.4g
サイコ・シャクヤク		ケイヒ末……0.7g
ダイオウ・トウニン		ダイオウ末……0.8g
ブクリョウ・ボタンビ		ブクリョウ末……0.5g

- ・本剤は淡褐色で、味はやや甘い素錠です。
- ・本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調が異なることや、また天然生薬色素により容器・包装等が黄味を帯びることがありますが、効果に変わりはありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 分包品において1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。

ワグラスB錠は漢薬の特性を活かした漢方薬ですので、あなたの体質や病状を考えて正しく服用することが大切です。

あなたの病気を早く治すため、お薬の服用に際しては、漢方薬のことをご理解いただいている医師・薬局・薬店の先生方とよくご相談下さい。

お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記をお願いします。

剂盛堂薬品株式会社 学術部

電話 073(472)3111(代表)

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元



剂盛堂薬品株式会社

〒640-8323 和歌山市太田515番地1