

この説明文書は、お薬とともに保管し、服用の際には、必ずお読みください。

第2類医薬品 生薬製剤

販売名：十一味敗因散

1.5g×60包(20日分)

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
 - (4) 胃腸の弱い人。
 - (5) 高齢者。
 - (6) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - (7) 次の症状のある人。むくみ
 - (8) 次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病
- 服用後、まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師の診療を受けること

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

- 1ヵ月位(化膿性皮膚病に服用する場合には1週間位)服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 本剤の服用により、まれに症状が進行することもあるので、このような場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

癬、癰、頭瘡、その他化膿性皮膚病、にきび、湿疹、じんましん、水虫

【用法・用量】

次の量を食前又は食間に、コップ半分以上のぬるま湯にて服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1包	3回
12歳以上15歳未満	2/3包	
7歳以上12歳未満	1/2包	
4歳以上7歳未満	1/3包	
4歳未満	服用しないでください	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

【成分・分量】1日量3包(4.5g)中

キジツ	0.369g	} エキス …… 1.899mL (固形物として0.074g)
シャクヤク	0.369g	
キキョウ	1.844g	} エキス …… 2.800mL (固形物として1.107g)
ケイガイ	0.369g	
サイコ	0.369g	
センキュウ	0.369g	
ボウフウ	1.107g	
レンギョウ	1.107g	
オウヒ	0.369g	
ドクカツ	0.369g	
カンゾウ末	1.107g	
ショウキョウ末	0.590g	
ブクリョウ末	1.622g	

本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがあります。効果に変わりはありません。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。

【お問い合わせ・発売元】

真漢方堂

福岡県福岡市早良区千隈3-16-1

TEL:0120-531-866

(午前9時～午後5時 土・日・祝日を除く)

【製造販売元】

劑盛堂薬品株式会社

和歌山市太田二丁目8番31号